

www.icivil.ir

پرتال جامع دانشجویان و مهندسين عمران

ارائه كتابها و جزوات رايجان مهندسي عمران

بهترين و برترين مقالات روز عمران

انجمن هاي تفصلي مهندسي عمران


خروشاگاه تفصلي مهندسي عمران

امتحان پایان ترم

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

75/10/16

1- نیم موج نشان داده شده در شکل را بر حسب توابع پله ای واحد بیان کنید و تبدیل لاپلاس آنرا بنویسید.



سپس معادله دیفرانسیل $y'' + 2y' + y = f(t)$ که در آن

$f(t)$ تابع معرفی شده در قسمت اول می باشد را با شرایط

$y(0) = 0$ و $y'(0) = 1$ و استفاده از تبدیل لاپلاس حل کنید.

پاسخ: $f(t) = \begin{cases} \sin t & 0 \leq t < \pi \\ 0 & \pi \leq t \end{cases} \Rightarrow f(t) = \sin t (u_0(t) - u_\pi(t)) \Rightarrow \ell\{f(t)\} = \ell\{\sin t\} - \ell\{u_\pi \sin t\}$

$$\Rightarrow \frac{1}{1+s^2} - e^{-\pi s} \ell\{\sin(t+\pi)\} = \frac{1}{1+s^2} + e^{-\pi s} \ell\{\sin t\} = \frac{1}{1+s^2} + \frac{e^{-\pi s}}{1+s^2} \Rightarrow \ell\{y'' + 2y' + y\} = \ell\{f(t)\} = \frac{1}{1+s^2} + \frac{e^{-\pi s}}{1+s^2}$$

$$\Rightarrow s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) + 2s(Y(s) - f(0)) + Y(s) = \frac{1}{1+s^2} + \frac{e^{-\pi s}}{1+s^2}, Y(s) = \ell\{y\} \Rightarrow (s^2 + 2s + 1)Y(s) - 1 = \ell\{f(t)\}$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{1}{(1+s)^2(1+s^2)} + \frac{e^{-\pi s}}{(1+s)^2(1+s^2)}, \ell\{u\} = F(s) = \frac{1}{s^2} \Rightarrow F(s+1) = \frac{1}{(s+1)^2} \Rightarrow \ell^{-1}\left\{\frac{1}{(s+1)^2}\right\} = e^{-t}t$$

$$\frac{1}{(1+s)^2(1+s^2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{s+2}{(s+1)^2} - \frac{s}{1+s^2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{s+1}{(s+1)^2} + \frac{1}{(s+1)^2} - \frac{s}{1+s^2} \right) \Rightarrow \ell^{-1}\left\{\frac{1}{(s+1)^2(1+s^2)}\right\} = \frac{1}{2}(e^{-t} + te^{-t} + \cos t)$$

$$e^{-\pi s} F(s) = u_\pi(t)f(t-\pi) \Rightarrow \frac{e^{-\pi s}}{(1+s)^2(1+s^2)} = \frac{1}{2} u_\pi(t)(e^{\pi-t} + (\pi-t)e^{\pi-t} - \cos t) \Rightarrow y = \ell^{-1}\{Y(s)\}$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{2}(e^{-t} + 3te^{-t} + \cos t + u_\pi(t)e^{\pi-t} + u_\pi(t)(\pi-t)e^{\pi-t} - u_\pi(t)\cos t) \quad \text{که } u_\pi(t) \text{ تابع پله ای واحد است.}$$

2- معادله دیفرانسیل زیر را حل کنید.

$$ty'' + 2y' + ty = 0, \quad y(0) = 1$$

((1))

پاسخ: $t=0$ یک نقطه منفرد منظم است. پس معادله شاخصی آن $r(r-1)+a_0r+b_0=0$ است که:

$$a_0 = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t}{t} = 2, b_0 = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2}{t} = 0 \Rightarrow r(r-1)+2r=0 \Rightarrow r_1=0, r_2=-1 \Rightarrow y_1 = x^0 \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} n(n+1)C_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+1} = 0 \rightarrow x^0 \text{ ضرب} \rightarrow 2c_1 = 0 \Rightarrow c_1 = 0, x^1 \text{ ضرب} \rightarrow 6c_2 + c_0 = 0 \Rightarrow c_2 = -\frac{c_0}{3!}$$

$$\dots\dots C_{2n} = \frac{(-1)^n C_0}{(2n+1)!}, y(0)=1 \Rightarrow C_0=1 \Rightarrow y_1 = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \dots$$

و چون اختلاف r_1 و r_2 عدد صحیح می باشد پس $y_2 = ky_1 \ln x + x^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} A_n x^n$ می باشد که با محاسبه y_2'' و y_2' و قرار دادن آن در معادله خواهیم داشت:

$$k \ln x (xy_1'' + 2y_1' + xy_1) + 2ky_1' + \frac{ky_1}{x} + \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)A_n x^{n-2} + \sum_{n=0}^{\infty} A_n x^n = 0$$

$$k=0, A_2 = -\frac{A_0}{2}, A_3 = -\frac{A_1}{3!}, A_4 = \frac{A_0}{4!}, \dots \text{ به دست می آید: } x, x^0, x^{-1}, x^{-2} \text{ ضرایب}$$

$$\text{و در نتیجه } y_2 = A_0 x^{-1} \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots \right) + A_1 x^{-1} \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \right)$$

می توان از آن صرف نظر کرد. پس جواب عمومی به صورت: $y = Ay_1 + By_2$ است.

3- تبدیل لاپلاس تابع زیر را پیدا کنید.

$$f(t) = t^2 e^{3t} \int_0^t e^{-\lambda} \cos(t-\lambda) d\lambda$$

$$f(\lambda) = e^{-\lambda}, g(\lambda) = \cos \lambda, h(t) = \int_0^t f(\lambda)g(t-\lambda)d\lambda, H(s) = \ell\{h(t)\} \quad \text{پاسخ: با توجه به تعریف کانولوشن داریم:}$$

$$\Rightarrow H(s) = F(s)G(s), F(s) = \ell\{f(t)\}, G(s) = \ell\{g(t)\} \Rightarrow \ell\left\{ \int_0^t e^{-\lambda} \cos(t-\lambda) d\lambda \right\} = \left(\frac{1}{1+s} \right) \left(\frac{s}{1+s^2} \right)$$

$$\ell\{e^{3t} h(t)\} = H(s-3) \Rightarrow \ell\left\{ e^{3t} \int_0^t e^{-\lambda} \cos(t-\lambda) d\lambda \right\} = \frac{s-3}{(s-2)(s^2-6s+8)} = F_1(s), f_1(t) = e^{3t} \int_0^t e^{-\lambda} \cos(t-\lambda) d\lambda$$

$$F_1(s) = \ell\{f_1(t)\} \Rightarrow \ell\{t^2 f_1(t)\} = F_1^{(2)}(s) = \frac{d^2 F_1(s)}{ds^2} \Rightarrow \ell\left\{ t^2 e^{3t} \int_0^t e^{-\lambda} \cos(t-\lambda) d\lambda \right\} = \left(\frac{s-3}{(s-2)(s^2-6s+8)} \right)''$$

((2))

4- انتگرال های زیر را ارزیابی کنید :

الف) $\int_0^1 (-\ln x)^{-\frac{1}{2}} dx$

ب) $\int_0^{\infty} e^{-at} \frac{\sin bt}{t} dt$

پاسخ : $\left\{ \begin{array}{l} x \rightarrow 0, t \rightarrow +\infty \\ x \rightarrow 1, t \rightarrow 0 \end{array} \right. \Rightarrow \int_0^1 (-\ln x)^{-\frac{1}{2}} dx \rightarrow -\int_0^{\infty} t^{-\frac{1}{2}} (-e^{-t} dt)$

$\Rightarrow \int_0^{\infty} t^{-\frac{1}{2}} e^{-t} dt = \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$

ب) $\int_0^{\infty} e^{-at} f(t) dt = \ell\{f(t)\} \Rightarrow \int_0^{\infty} e^{-at} \frac{\sin bt}{t} dt = \ell\left\{\frac{\sin bt}{t}\right\}, a=s$ با توجه به تعریف لاپلاس داریم :

$f(t) = \frac{\sin bt}{t} \Rightarrow \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin bt}{t} = b \rightarrow$ موجود است $\Rightarrow \ell\left\{\frac{\sin bt}{t}\right\} = \int_0^{\infty} F(u) du, F(s) = \ell\{f(t)\} = \frac{b}{s^2 + b^2}$

$\Rightarrow \ell\left\{\frac{\sin bt}{t}\right\} = \int_0^{\infty} \left(\frac{b}{u^2 + b^2}\right) du = b \tan^{-1} \frac{u}{b} \Big|_0^{\infty} = b \left(\frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \frac{s}{b}\right) \rightarrow b \left(\frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \frac{a}{b}\right)$ و در پایان به جای s ، a را قرار می دهیم.

5- تبدیل معکوس تابع $\frac{3(1+s^2)}{s^6} e^{-4s}$ را به دست آورید :

پاسخ : $\ell^{-1}\{e^{-as} F(s)\} = u_c(t) f(t-c), F(s) = \ell\{f(t)\}$

$\Rightarrow F(s) = \frac{3(1+s^2)}{s^6} \Rightarrow \ell^{-1}\{F(s)\} = f(t) \Rightarrow \ell^{-1}\left\{\frac{3(1+s^2)}{s^6}\right\} = \ell^{-1}\left\{\frac{3}{s^6} + \frac{3}{s^4}\right\} = 3\ell^{-1}\left\{\frac{5!}{s^6} \times \frac{1}{5!}\right\} + 3\ell^{-1}\left\{\frac{3!}{s^4} \times \frac{1}{3!}\right\}$

$= \frac{3}{5!} t^5 + \frac{3}{3!} t^3 \Rightarrow \ell^{-1}\left\{e^{-4s} \frac{3(1+s^2)}{s^6}\right\} = u_4(t) f(t-4) = u_4(t) \left[\frac{1}{40} (t-4)^5 + \frac{1}{2} (t-4)^3\right]$

1- دستگاه معادلات زیر را حل کنید .

$$\begin{cases} y_1' + y_2' = 2\sinh t \\ y_2' + y_3' = e^t \\ y_3' + y_1' = 2e^t + e^{-t} \end{cases}, \quad y_1(0) = y_2(0) = 1, \quad y_3(0) = 0$$

پاسخ: $\ell\{y'\} = s\ell\{y\} - y(0)$ داریم: $\ell\{y_1\} = Y_1(s)$, $\ell\{y_2\} = Y_2(s)$, $\ell\{y_3\} = Y_3(s)$

$$\begin{cases} \ell\{y_1'\} + \ell\{y_2'\} = \ell\{2\sinh t\} \\ \ell\{y_2'\} + \ell\{y_3'\} = \ell\{e^t\} \\ \ell\{y_3'\} + \ell\{y_1'\} = \ell\{2e^t\} + \ell\{e^{-t}\} \end{cases}$$

$$\begin{cases} sY_1(s) - 1 + sY_2(s) - 1 = 2\ell\{\sinh t\} = \frac{2}{s^2 - 1} \\ sY_2(s) - 1 + sY_3(s) = \ell\{e^t\} = \frac{1}{s - 1} \\ sY_3(s) + sY_1(s) - 1 = 2\ell\{e^t\} + \ell\{e^{-t}\} = \frac{2}{s - 1} + \frac{1}{s + 1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} sY_1(s) + sY_2(s) = \frac{2s^2}{s^2 - 1} \\ sY_2(s) + sY_3(s) = \frac{s}{s - 1} \\ sY_3(s) + sY_1(s) = \frac{s^2 + 3s}{s^2 - 1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Y_1(s) + Y_2(s) = \frac{2s}{s^2 - 1} \\ Y_2(s) + Y_3(s) = \frac{1}{s - 1} \\ Y_3(s) + Y_1(s) = \frac{s + 3}{s^2 - 1} \end{cases}$$

$$Y_1(s) = \left(\frac{1}{s - 1}\right), \quad Y_2(s) = \left(\frac{1}{s + 1}\right), \quad Y_3(s) = \left(\frac{2}{s^2 - 1}\right)$$

پس از حل دستگاه بالا خواهیم داشت:

$$\Rightarrow y_1 = \ell^{-1}\{Y_1(s)\} = e^t, \quad y_2 = \ell^{-1}\{Y_2(s)\} = e^{-t}, \quad y_3 = \ell^{-1}\{Y_3(s)\} = e^t - e^{-t}$$

2- الف) سه جمله اول بسط تابع زیر را بر حسب توابع لژاندر بیان کنید.

$$f(x) = \begin{cases} x + 4 & 0 < x \leq 1 \\ 3 & -1 \leq x < 0 \end{cases}$$

ب) با استفاده از تغییر متغیر $z = x^2$ و $y = x^{\frac{1}{2}}u$ معادله $y'' + 4x^2y = 0$ را حل کنید.

پاسخ: الف) چون $f(x)$ در شرایط قضیه دیرکله صدق می کند پس داریم: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n P_n(x)$ که $C_n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_n(x) dx$

همچنین می‌دانیم: $P_0(x)=1$, $P_1(x)=x$, $P_2(x)=\frac{3}{2}x^2-\frac{1}{2}$ پس:

$$C_0 = \frac{1}{2} \int_{-1}^0 (3)(1) dx + \frac{1}{2} \int_0^1 (x+4)(1) dx = \frac{15}{4}$$

$$C_1 = \frac{3}{2} \int_{-1}^0 (3)(x) dx + \frac{3}{2} \int_0^1 (x+4)(x) dx = \frac{5}{4} , C_2 = \frac{5}{2} \int_{-1}^0 \left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}\right) dx + \frac{5}{2} \int_0^1 (x+4)\left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}\right) dx = \frac{5}{16}$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{15}{4}P_0(x) + \frac{5}{4}P_1(x) + \frac{5}{16}P_2(x)$$

(ب) $z = x^2 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 2x$, $y' = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}u + x^{\frac{1}{2}}\frac{du}{dx}$, $\frac{du}{dx} = \frac{du}{dz} \times \frac{dz}{dx} = 2x \frac{du}{dz} \Rightarrow y' = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}u + 2x^{\frac{3}{2}}\frac{du}{dz}$

$$y'' = -\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}}u + x^{\frac{1}{2}}\frac{du}{dz} + 3x^{\frac{1}{2}}\frac{du}{dz} + 2x^{\frac{3}{2}} \times 2x \frac{d^2u}{dz^2} \Rightarrow y'' + 4x^2y = -\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}}u + 4x^{\frac{1}{2}}\frac{du}{dz} + 4x^{\frac{5}{2}}\frac{d^2u}{dz^2} + 4x^{\frac{5}{2}}u = 0$$

طرفین معادله بالا را در $x^{\frac{3}{2}}$ ضرب و بر 4 تقسیم می‌کنیم:

$$\rightarrow 4x^4 \frac{d^2u}{dz^2} + 4x^2 \frac{du}{dz} + \left(4x^4 - \frac{1}{4}\right)u = 0 , z = x^2$$

که یک معادله بسل نوع اول می‌باشد که جواب آن به فرم زیر می‌باشد.

$$\Rightarrow z^2 \frac{d^2u}{dz^2} + z \frac{du}{dz} + \left(z^2 - \frac{1}{16}\right)u = 0$$

$$y = x^{\frac{1}{2}} \left[A J_{\frac{1}{4}}(x^2) + B Y_{\frac{1}{4}}(x^2) \right]$$

3- نشان دهید $x=0$ یک نقطه منفرد منظم معادله زیر می‌باشد.

$$x^2 y'' + x(3-x^2)y' - 3y = 0$$

و اگر $y_1 = x \left(3 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2^7}x^4 + \dots \right)$ باشد، جواب دوم را پیدا کنید.

پاسخ: قسمت اول - مشاهده می‌شود که توابع $f_1(x) = x \times \frac{x(3-x^2)}{x^2} = 3-x^2$ و $f_2(x) = x^2 \times \frac{-3}{x^2} = -3$ در نقطه $x=0$ تحلیلی

هستند یعنی در این نقطه دارای بسط تیلور می‌باشند زیرا هر دو تابع $f_1 = 3-x^2$ و $f_2 = -3$ و تمامی مشتقاتشان در همسایگی $x=0$

تعریف شده‌اند. پس چون این دو تابع در $x=0$ تحلیلی هستند پس $x=0$ یک نقطه منفرد منظم برای معادله فوق است.

بنابراین معادله شاخصی به صورت $r(r-1) + a_0 r + b_0 = 0$ است که در آن $a_0 = \lim_{x \rightarrow 0} (3 - x^2) = 3$, $b_0 = \lim_{x \rightarrow 0} (-3) = -3$ می باشد.

در نتیجه $r_1 = 1$ و $r_2 = -3$ می باشند و چون تفاضل آنها یک عدد صحیح است پس $y_2 = ky_1 \ln x + x^{-3} \sum_{n=0}^{\infty} A_n x^n$ می باشد.

$$\Rightarrow y_2' = ky_1' \ln x + ky_1 \frac{1}{x} + \sum_{n=0}^{\infty} (n-3) A_n x^{n-4} , y_2'' = ky_1'' \ln x + 2ky_1' \frac{1}{x} - ky_1 \frac{1}{x^2} + \sum_{n=0}^{\infty} (n-3)(n-4) A_n x^{n-5}$$

$$\Rightarrow (x^2 y_1'' + x(3-x^2) y_1' - 3y_1) k \ln x + 2kx y_1' - kx^2 y_1 + 2ky_1 - \sum_{n=0}^{\infty} (n-3) A_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} n(n-4) A_n x^{n-3} = 0$$

چون y_1 ریشه معادله می باشد پس ضریب $k \ln x$ برابر صفر است.

$$\Rightarrow 2k \left(3x + \frac{3}{4} x^3 + \frac{15}{2} x^5 + \dots \right) - k \left(3x^3 + \frac{1}{4} x^5 + \frac{3x^7}{2} + \dots \right) + 2k \left(3x + \frac{1}{4} x^3 + \frac{3x^5}{2} + \dots \right) - \sum_{n=0}^{\infty} (n-3) A_n x^{n-1}$$

$$+ \sum_{n=0}^{\infty} n(n-4) A_n x^{n-3} = 0 , x^{-3} \text{ ضریب } = 0 \Rightarrow A_0 = \text{پارامتر} , x^{-2} \text{ ضریب } = 0 \Rightarrow -3A_1 = 0 \rightarrow A_1 = 0$$

$$x^{-1} \text{ ضریب } = 0 \Rightarrow 3A_0 - 4A_2 = 0 \Rightarrow A_2 = \frac{3}{4} A_0 , x^0 \text{ ضریب } = 0 \Rightarrow 2A_1 + 0A_4 = 0 \rightarrow A_4 = 0$$

$$x^1 \text{ ضریب } = 0 \Rightarrow 6k + 6k + A_2 + 0A_4 = 0 \Rightarrow k = -\frac{1}{16} , \Rightarrow y_2 = -\frac{1}{16} y_1 \ln x + x^{-3} \left(1 + \frac{3}{4} x^2 + \dots \right) \Rightarrow y = Ay_1 + By_2$$

4- الف) مقدار انتگرال زیر را محاسبه نمایید.

$$I = \int_0^{\infty} e^{-3t} t (\sin^2 t) \left[\ell^{-1} \ln \frac{s}{s-1} \right] dt$$

ب) تبدیل معکوس تابع $F(s) = e^{-s} \frac{1}{s^2 + 1}$ را حساب کنید.

پاسخ: می دانیم $\ell\{f(t)\} = F(s) \Rightarrow -\frac{\ell^{-1}\{F'(s)\}}{t} = f(t)$, اکنون با فرض $F(s) = \ln \frac{s}{s-1}$ مسئله را حل می کنیم.

$$F(s) = \ln \frac{s}{s-1} \Rightarrow F'(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s-1} \Rightarrow -\frac{1}{t} \ell^{-1} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s-1} \right) = f(t) \Rightarrow \ell^{-1}\{F(s)\} = \frac{1}{t} (e^t - 1)$$

$$\Rightarrow I = \int_0^{\infty} [e^{-2t} (\sin^2 t) - e^{-3t} (\sin^2 t)] dt = \int_0^{\infty} e^{-2t} \left(\frac{1 - \cos 2t}{2} \right) dt - \int_0^{\infty} e^{-3t} \left(\frac{1 - \cos 2t}{2} \right) dt$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \left(\int_0^{\infty} e^{-2t} dt - \int_0^{\infty} e^{-3t} dt - \int_0^{\infty} e^{-2t} \cos 2t dt + \int_0^{\infty} e^{-3t} \cos 2t dt \right) \cdot \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt = \ell\{f(t)\} \Rightarrow \int_0^{\infty} e^{-3t} \cos 2t = \frac{3}{3^2 + 4} = \frac{3}{13}$$

$$\int_0^{\infty} e^{-2t} \cos 2t dt = \frac{2}{2^2 + 4} = \frac{1}{4}, \quad \int_0^{\infty} e^{-2t} dt = -\frac{1}{2}, \quad \int_0^{\infty} e^{-3t} dt = -\frac{1}{3} \Rightarrow I = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{3}{13} \right) = -\frac{29}{312}$$

$$\ell\{u_c(t)f(t-c)\} = e^{-cs}F(s) \Rightarrow \ell^{-1}\{e^{-cs}F(s)\} = u_c(t)f(t-c), \quad F(s) = \frac{1}{s^2+1} \Rightarrow \ell^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+1}\right\} = \sin t \quad (\text{ب})$$

$$\Rightarrow \ell^{-1}\left\{e^{-s\pi} \frac{1}{s^2+1}\right\} = u_{\pi}(t)\sin(t-\pi) = -u_{\pi}(t)\sin t$$

که u_{π} تابع پله ای واحد است.

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + t \frac{dy}{dt} - y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 5$$

5- با استفاده از تبدیل لاپلاس معادله روپرو را حل کنید.

$$\Rightarrow \ell\{y''\} + \ell\{ty'\} - \ell\{y\} = 0, \quad \ell\{tf(t)\} = -F'(s), \quad \ell\{y''\} = s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0)$$

پاسخ: ابتدا از طرفین لاپلاس می گیریم:

$$\Rightarrow s^2 Y(s) - 5 - (sY(s))' - Y(s) = 0 \Rightarrow -sY'(s) + (s^2 - 2)Y(s) - 5 = 0 \Rightarrow Y'(s) + \left(\frac{2}{s} - s\right)Y(s) = -\frac{5}{s}$$

که یک معادله خطی می باشد و برای حل آن داریم:

$$\mu(s) = e^{\int \left(\frac{2}{s} - s\right) ds} = \frac{s^2}{e^{\frac{s^3}{3}}} \rightarrow Y(s) = \frac{e^{\frac{s^3}{3}}}{s^2} \int \left(\frac{-5s}{s^2}\right) ds = \frac{5}{s^2} + c \left(\frac{e^{\frac{s^3}{3}}}{s^2}\right), \quad \lim_{s \rightarrow \infty} Y(s) = 0 \rightarrow c = 0 \Rightarrow Y(s) = \frac{5}{s^2} \Rightarrow y(t) = 5t$$

6- اگر $\ell\{J_0(t)\} = \frac{1}{\sqrt{1+s^2}}$ باشد، با استفاده از رابطه $J_0'(t) = -J_1(t)$ و $J_0(0) = 1$ نشان دهید که:

$$\int_0^t \sin(t-\lambda) J_0(\lambda) d\lambda \doteq t J_1(t)$$

$$J_0'(t) = -J_1(t) \Rightarrow \ell\{J_0'(t)\} = -\ell\{J_1(t)\} \Rightarrow s\ell\{J_0(t)\} - J_0(0) = -\ell\{J_1(t)\} \Rightarrow \ell\{J_1(t)\} = 1 - \frac{s}{\sqrt{1+s^2}} \quad (A)$$

پاسخ:

$$\ell\{tf(t)\} = -F'(s) \Rightarrow \ell\{tJ_1(t)\} = -\frac{d}{ds} \left(1 - \frac{s}{\sqrt{1+s^2}} \right) = \frac{1}{(1+s^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (B)$$

از طرفی داریم با استفاده از رابطه (A):

اکنون از طریق کاتولوشن برای محاسبه انتگرال داریم:

$$\ell\left\{\int_0^t \sin(t-\lambda)J_0(\lambda)d\lambda\right\} = \ell\{\sin t\} \times \ell\{J_0(t)\} = \frac{1}{1+s^2} \times \frac{1}{\sqrt{1+s^2}} = \frac{1}{(1+s^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (C)$$

با استفاده از روابط (B) و (C) نتیجه می گیریم:

$$\ell\left\{\int_0^t \sin(t-\lambda)J_0(\lambda)d\lambda\right\} = \ell\{J_1(t)\} \Rightarrow \int_0^t \sin(t-\lambda)J_0(\lambda)d\lambda = J_1(t)$$

76/10/16

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

امتحان پایان ترم

1- بر حسب مقادیر مختلف n ، $\int_{-1}^1 (x^4 + x)P_n(x)dx$ را ارزیابی کنید.

توجه:

$$P_{n+1}(x) = \frac{2n+1}{n+1}xP_n(x) - \frac{n}{n+1}P_{n-1}(x)$$

پاسخ: می دانیم $P_0(x) = 1$ و $P_1(x) = x$ و از رابطه معرفی شده به دست می آوریم: $P_2(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}$ و $P_3(x) = \frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x$

همچنین $C_n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 f(x)P_n(x)dx$ بنابراین:

$$C_0 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (x^4 + x)dx = \frac{1}{2} \left(\frac{x^5}{5} + \frac{x^2}{2} \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{5}$$

$$C_1 = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 (x^5 + x^2)dx = \frac{3}{2} \left(\frac{x^6}{6} + \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-1}^1 = 1, \quad C_2 = \frac{5}{2} \int_{-1}^1 \frac{1}{2} (3x^6 - x^4 + 3x^3 - x)dx = \frac{5}{4} \left(\frac{3x^7}{7} - \frac{x^5}{5} + \frac{3x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{4}{7}$$

$$C_3 = \frac{7}{2} \int_{-1}^1 \frac{1}{2} (5x^7 - 3x^5 + 5x^4 - 3x^2)dx = \frac{7}{4} \left(\frac{5x^8}{8} - \frac{x^6}{2} + x^5 - x^3 \right) \Big|_{-1}^1 = 0, \Rightarrow f(x) = \frac{1}{5}P_0(x) + P_1(x) + \frac{4}{7}P_2(x)$$

$$\Rightarrow \int_{-1}^1 f(x)P_n(x)dx = \frac{1}{5} \int_{-1}^1 P_0(x)P_n(x)dx + \int_{-1}^1 P_1(x)P_n(x)dx + \frac{4}{7} \int_{-1}^1 P_2(x)P_n(x)dx, \quad \int_{-1}^1 P_n(x)P_m(x)dx = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ \frac{2}{2n+1} & m = n \end{cases}$$

$$\Rightarrow \int_{-1}^1 (x^4 + x)P_n(x)dx = \begin{cases} m=0 \rightarrow \frac{2}{5} \\ m=1 \rightarrow \frac{2}{3} \\ m=2 \rightarrow \frac{8}{35} \\ m>2 \rightarrow 0 \end{cases}$$

2- یک جواب معادله زیر $y_1 = x$ است، جواب مستقل دیگر آن را به کمک سری ها بیابید.

$$(x^2 - x)y'' + xy' - y = 0$$

پاسخ: از آنجا که نقطه $x = 0$ یک نقطه منفرد منظم است، برای معادله شاخصی داریم:

$$a_0 = \lim_{x \rightarrow 0} x \frac{x}{x^2 - x} = 0$$

و $b_0 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2}{x^2 - x} = 0$ بنابراین با حل معادله شاخصی به دست می آید: $r_1 = 1$ ، $r_2 = 0$ و چون اختلاف ایندو یک عدد صحیح

است، پس:

$$y_2 = k + k \ln x + \sum_{n=0}^{\infty} n C_n x^{n-1} \quad \text{و} \quad y_2 = k \ln x y_1 + x^0 \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = k x \ln x + \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$$

با جایگذاری این مقادیر در معادله داریم:

$$2kx - k + \sum_{n=0}^{\infty} (n^2 - 1) C_n x^n - n(n-1) C_n x^{n-1} = 0 \quad y_2'' = \frac{k}{x} + \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) C_n x^{n-2}$$

x^{-1} ضریب $= 0 \rightarrow C_0$ پارامتر، x^0 ضریب $= 0 \rightarrow -k - C_0 = 0 \Rightarrow k = -C_0$ ، x^1 ضریب $= 0 \rightarrow 2k + 0C_1 - 2C_2 = 0 \Rightarrow k = C_2$

x^2 ضریب $= 0 \rightarrow 3C_2 - 6C_3 = 0 \Rightarrow C_3 = \frac{1}{2}C_2$ ، x^3 ضریب $= 0 \rightarrow 8C_3 - 8C_4 = 0 \Rightarrow C_3 = C_4$

با فرض $C = 1$ جواب عمومی معادله به فرم زیر می باشد.

$$\Rightarrow y_2 = C \left(x \ln x - 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} + \dots \right)$$

$$y = Ay_1 + By_2$$

3- با استفاده از تغییر متغیر $z = 3x^2$ و $y = ux$ معادله زیر را حل کنید.

$$x^2 y'' - xy' + (36x^4 - 15)y = 0$$

پاسخ: با جایگذاری مقادیر روبرو در معادله فوق $y'' = 2u' + xu''$ ، $y' = u + xu'$ ، و حذف x داریم:

$$z = 3x^2 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 6x, \quad u' = \frac{du}{dx} = \frac{du}{dz} \times \frac{dz}{dx} = 6x \frac{dz}{dx} \quad \text{اما} \quad x^2 u'' + xu' + 4(9x^4 - 4)u = 0 \quad (A)$$

$$z^2 \frac{d^2 u}{dz^2} + z \frac{du}{dz} + (z^2 - 4)u = 0 \quad \text{و} \quad u'' = u \frac{du}{dz} + (4)(9)x^2 \frac{d^2 u}{dz^2} \quad \text{با جایگذاری این مقادیر در (A) خواهیم داشت:}$$

$$u = AJ_2(z) + BY_2(z) \rightarrow y = x[AJ_2(3x^2) + BY_2(3x^2)] \quad \text{و در پایان:}$$

4- عبارات زیر را محاسبه کنید.

$$\ell^{-1} \left\{ \frac{(s+1)e^{\frac{-2\pi}{\sqrt{3}}s}}{s^2+s+1} \right\} \quad (\text{ب})$$

$$\ell \left\{ t \operatorname{cht} \int_0^t \frac{e^{3r} - e^r}{r} dr \right\} \quad (\text{الف})$$

پاسخ: قسمت الف از مباحث حذف شده است. (ب)

$$\ell^{-1} \left\{ \frac{(s+1)e^{\frac{-2\pi}{\sqrt{3}}s}}{s^2+s+1} \right\} = u_{\frac{2\pi}{\sqrt{3}}}(t) f\left(t - \frac{2\pi}{\sqrt{3}}\right), \quad f(t) = \ell^{-1} \left\{ \frac{\left(s + \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} \right\}$$

می دانیم: $\ell^{-1}\{F(s+a)\} = e^{-at}f(t)$ پس با فرض $F(s) = \frac{s}{s^2 + \frac{3}{4}} + \frac{\frac{1}{2}}{s^2 + \frac{3}{4}}$ داریم: $\ell^{-1}\{F(s)\} = \cos \frac{\sqrt{3}}{2}t + \frac{\sqrt{3}}{3} \sin \frac{\sqrt{3}}{2}t$

$$\Rightarrow f(t) = e^{-\frac{1}{2}t} \left(\cos \frac{\sqrt{3}}{2}t + \frac{\sqrt{3}}{3} \sin \frac{\sqrt{3}}{2}t \right) \Rightarrow \ell^{-1} \left\{ \frac{(s+1)e^{\frac{-2\pi}{\sqrt{3}}s}}{s^2+s+1} \right\} = u_{\frac{2\pi}{\sqrt{3}}}(t) e^{\frac{\pi}{\sqrt{3}} - \frac{t}{2}} \left(\cos \frac{\sqrt{3}}{2}t + \frac{\sqrt{3}}{3} \sin \frac{\sqrt{3}}{2}t \right)$$

5- معادله زیر را به کمک تبدیلات لاپلاس حل کنید.

$$ty'' - (2+t)y' + 3y = t-1, \quad y(0)=0$$

پاسخ:

$$\ell\{ty''\} = -(s^2Y(s) - sy(0) - y'(0)) = -(s^2Y'(s) + 2sY(s)), \quad \ell\{ty'\} = -(sY'(s) + Y(s))$$

اکنون از طرفین معادله لاپلاس می گیریم.

$$\Rightarrow -(s^2Y'(s) + 2sY(s)) + (sY'(s) + Y(s)) - 2sY(s) + 3Y(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s}$$

که یک معادله خطی می باشد.

$$\Rightarrow (-s^2 + s)Y'(s) + (4 - 4s)Y(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s} \Rightarrow Y'(s) + \frac{4}{s}Y(s) = -\frac{1}{s^3}$$

$$\mu(s) = e^{\int \frac{4}{s} ds} = s^4 \Rightarrow Y(s) = s^{-4} \int -\frac{s^4}{s^3} ds = s^{-4} \left(-\frac{s^2}{2} + c \right) = -\frac{1}{2s^2} \rightarrow y(t) = \ell^{-1} \left\{ -\frac{1}{2s^2} \right\} = -\frac{1}{2}t$$

6- دستگاه زیر را با هر روشی که می خواهید حل کنید .

$$\begin{cases} y_1''(t) + y_2'(t) - 2y_1'(t) = 66 \\ y_1''(t) + 3y_2(t) = 9t^2 - 2 \end{cases}, y_1(0) = y_2(0) = y_1'(0) = 1, y_2'(0) = -2$$

پاسخ: از طرفین معادله لاپلاس می گیریم .

$$\Rightarrow \begin{cases} s^2 Y_1(s) + (s^2 - 2s) Y_2(s) = \frac{66}{s} - 2 \\ s^2 Y_1(s) + 3Y_2(s) = \frac{18}{s^3} - \frac{2}{s} \end{cases} \Rightarrow (s^2 - 2s - 3) Y_2(s) = \frac{66}{s} - 2 - \frac{18}{s^3}$$

$$\Rightarrow Y_2(s) = \frac{-18s^2 - 4s + 6}{s^3} + \frac{13}{s+1} + \frac{5}{s-3} = -\frac{18}{s} - \frac{4}{s^2} + \frac{6}{s^3} + \frac{13}{s+1} + \frac{5}{s-3}, y_2(t) = \ell^{-1}\{Y_2(s)\}$$

$$\Rightarrow y_2(t) = -18 - 4t + 3t^2 + 13e^{-t} + 5e^{3t}$$

با جایگذاری مقدار روبرو در دستگاه، عبارت زیر به دست می آید:

$$Y_1(s) = \frac{52}{s^3} + \frac{12}{s^4} - \frac{39}{s^2(s+1)} - \frac{15}{s^2(s-3)} = \frac{52}{s^3} + \frac{12}{s^4} + 39\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s+1}\right) + \frac{5}{3}\left(\frac{1}{s} + \frac{3}{s^2} - \frac{1}{s-3}\right), \ell^{-1}\{Y_1(s)\} = y_1(t)$$

$$\Rightarrow y_1(t) = 26t^2 + 2t^3 + 39(1 - t - e^{-t}) + \frac{5}{3}(1 + 3t - e^{3t})$$

77/3/1

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

امتحان پایان ترم

1- نشان دهید که نقطه $x = 0$ یک نقطه منفرد منظم برای معادله دیفرانسیل زیر می باشد و سپس معادله زیر را حل کنید .

$$x^2 y'' - x^2 y' + (x^2 - 2)y = 0$$

پاسخ: این سوال عیناً در کتاب معادلات دیفرانسیل دکتر نیکوکار، در صفحه 351، مجموعه مسائل 4.4، سوال 14 موجود می باشد.

$$P_{n+1}'(x) = xP_n'(x) + (n+1)P_n(x) \quad n \geq 0, P_n(1) = 1$$

2- با استفاده از رابطه بازگشتی روبرو

$$\int_{-1}^1 f(x) P_n(x) dx$$

و با فرض $f(x) = 2x^4 + x - 1$ ، انتگرال روبرو را ارزیابی کنید.

پاسخ: می دانیم $P_0(x) = 1$ و از رابطه بازگشتی به دست می آید:

$$P_1(x) = x, \quad P_2(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}, \quad P_3(x) = \frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x$$

$$C_0 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (2x^4 + x - 1) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{5}x^5 + \frac{x^2}{2} - x \right) \Big|_{-1}^1 = -\frac{3}{5}$$

و همین طور $C_n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 P_n(x) f(x) dx$ بنابراین داریم:

$$C_1 = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 (2x^5 + x^2 - x) dx = \frac{3}{2} \left(\frac{2}{6}x^6 + \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_{-1}^1 = 1$$

$$C_2 = \frac{5}{4} \int_{-1}^1 (3x^2 - 1)(2x^4 + x - 1) dx = \frac{5}{4} \int_{-1}^1 (6x^6 - 2x^4 + 3x^3 - 3x^2 - x + 1) dx = \frac{5}{4} \left(\frac{6}{7}x^7 - \frac{2}{5}x^5 + \frac{3}{4}x^4 - x^3 - \frac{x^2}{2} + x \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{8}{7}$$

$$C_3 = \frac{7}{2} \int_{-1}^1 \left(\frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x \right) (2x^4 + x - 1) dx = \frac{7}{2} \int_{-1}^1 \left(5x^7 + \frac{5}{2}x^4 - \frac{5}{2}x^3 - 3x^5 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{3}{2}x \right) dx = \dots = 0$$

$$\Rightarrow f(x) = -\frac{3}{5}P_0(x) + P_1(x) + \frac{8}{7}P_2(x) \Rightarrow I = \int_{-1}^1 \left(-\frac{3}{5}P_0(x)P_n(x) + P_1(x)P_n(x) + \frac{8}{7}P_2(x)P_n(x) \right) dx$$

$$\Rightarrow I = -\frac{3}{5} \int_{-1}^1 P_0(x)P_n(x) dx + \int_{-1}^1 P_1(x)P_n(x) dx + \frac{8}{7} \int_{-1}^1 P_2(x)P_n(x) dx \Rightarrow I = \begin{cases} \frac{3}{5} \times 2 = \frac{6}{5}, & n=0 \\ \frac{2}{3}, & n=1 \\ \frac{8}{7} \times \frac{2}{5} = \frac{16}{35}, & n=2 \\ 0, & n>2 \end{cases}$$

3- مطلوب است محاسبه

$$\ell \{t\}$$

(ب)

$$\int x^4 J_1(x) dx$$

(الف)

$$u = x^2 \Rightarrow du = 2x dx, \quad dv = x^2 J_1(x) \Rightarrow v = x^2 J_2(x)$$

پاسخ: (الف) با استفاده از جز به جز داریم:

$$\Rightarrow \int x^4 J_1(x) dx = x^4 J_2(x) - \int 2x^3 J_2(x) dx = x^4 J_2(x) - 2x^3 J_3(x) + c$$

$$[t] = n, \quad n < t < n+1 \Rightarrow [t] = t + n - t, \quad n < t < n+1, \quad f(t) = t + n$$

(ب)

$\Leftarrow \ell\{f(t)\} - \ell\{u\} = \ell\{f(t) - u\}$ ، تابعی متناوب با دوره تناوب 1 می باشد و در نتیجه :

$$\ell\{f(t)\} = \frac{1}{1-e^{-1}} \int_0^1 t e^{-st} dt = \frac{1+s}{s^2} - \frac{1}{s(1-e^{-1})} \Rightarrow \ell\{f(t)\} = \frac{1}{s^2} - \frac{1+s}{s^2} + \frac{1}{s(1-e^{-1})} = \frac{1}{s} \left(\frac{1}{e-1} \right)$$

$$(J_0(x) = 1)$$

4- با استفاده از تبدیل لاپلاس ، لاپلاس تابع $J_0(x)$ را به دست آورید .

پاسخ : از مباحث امتحانی حذف شده است ، اما برای حل آن باید از رابطه $J_\nu(x) = \sum \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(n+\nu+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+\nu}$ ، $J_0(x)$ را

پیدا کرده و سپس با استفاده از بسط نیوتن لاپلاس آن را نوشته و در پایان به دست می آید : $\ell\{J_0(t)\} = \frac{1}{\sqrt{1+s^2}}$

5- الف) تبدیل لاپلاس تابع زیر را بیابید .

$$f(t) = e^{-2t} \sin^2 t + u_2(t) \cosh 2t$$

$$y(t) = \sin t + \int_0^t \lambda y(t-\lambda) e^{-\lambda} \{\cot^{-1} s\} d\lambda$$

ب) معادله زیر را حل کنید .

پاسخ : $\ell\{e^{bt} f(t)\} = F(s-b) \Rightarrow \ell\{e^{-2t} \sin^2 t\} = F(s+2)$ ، $F(s) = \ell\{\sin^2 t\} = \ell\left\{\frac{1-\cos 2t}{2}\right\} = \ell\left\{\frac{1}{2}\right\} - \frac{1}{2} \ell\{\cos 2t\}$

$$\Rightarrow \ell\{\sin^2 t\} = \frac{1}{2s} - \frac{1}{2} \left\{ \frac{s}{s^2+4} \right\} , \ell\{e^{-2t} \sin^2 t\} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{s+2} + \frac{s+2}{(s+2)^2+4} \right]$$

$$\ell\{u_c(t) f(t)\} = e^{-cs} \ell\{f(t+c)\} , f(t) = \cosh 2t \Rightarrow \ell\{\cosh 2(2+t)\} = \ell\{\cosh 2t \cosh 4 + \sinh 2t \sinh 4\}$$

$$\Rightarrow \ell\{u_2(t) \cosh 2t\} = e^{-2s} \left[\frac{e^8+1}{2e^4} \left(\frac{s}{s^2-4} \right) + \frac{e^8-1}{2e^4} \left(\frac{2}{s^2-4} \right) \right]$$

$$\ell\{f(t)\} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{s+2} + \frac{s+2}{(s+2)^2+4} \right] + \frac{e^{-2s}}{s^2-4} \left[\frac{e^8+1}{2e^4} s + \frac{e^8-1}{e^4} \right]$$

و در پایان داریم :

((13))

$$\ell^{-1}\{F'(s)\} = -\lambda f(\lambda), \quad F(s) = f(\lambda) \Rightarrow F(s) = \cot^{-1} s \rightarrow F'(s) = \frac{-1}{1+s^2} \Rightarrow \ell^{-1}\left\{\frac{-1}{1+s^2}\right\} = -\sin \lambda \quad (\text{ب})$$

$$\Rightarrow \ell^{-1}\{\cot^{-1} s\} = \frac{\sin \lambda}{\lambda} \Rightarrow y(t) = \sin t + \int_0^t y(t-\lambda) \frac{\sin \lambda}{\lambda} d\lambda = \sin t + \int_0^t \sin \lambda y(t-\lambda) d\lambda$$

$$\Rightarrow \ell\{y(t)\} = \frac{1}{1+s^2} + \left(\frac{1}{1+s^2}\right) \ell\{y(t)\} \Rightarrow y(t) = \ell^{-1}\left\{\frac{1}{(1+s^2)\left(1-\frac{1}{1+s^2}\right)}\right\} = \ell^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} = t \quad \text{از طرفين لاپلاس مي گيريم:}$$

6- دستگاه معادله زیر را حل کنید.

$$\begin{cases} x''(t) + y''(t) - 2y'(t) = 6 \\ x''(t) + 3y(t) = 9t^2 - 2 \end{cases}, \quad x(0) = x'(0) = y(0) = 0, \quad y'(0) = 2$$

پاسخ: به جواب مسئله 6 امتحان قبل رجوع کنید.

77/11/10

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

امتحان پایان ترم

1- الف) آیا تابع زیر را می توان به صورت چند جمله ای لژاندر بسط داد. (توضیح دهید)

$$f(x) = \begin{cases} 1+x & -1 < x < 0 \\ 1 & 0 \leq x < 1 \end{cases}$$

ب) با استفاده از فرمول بازگشتی داده شده زیر چهار جمله اول بسط تابع بالا را بر حسب چند جمله ای های لژاندر بیان کنید.

$$P'_{n+1}(x) - P'_{n-1}(x) = (2n+1)P_n(x)$$

پاسخ: الف) چون هر دو ضابطه $f(x)$ چند جمله ای بوده و در شرایط قضیه دیرکله صدق می کنند، پس می توان $f(x)$ را به صورت

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n P_n(x) \quad \text{نوشت.}$$

$$C_0 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_0(x) dx = \frac{1}{2} \left[\int_{-1}^0 (1+x)(1) dx + \int_0^1 (1)(1) dx \right] = \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{2} + x \right)_{-1}^0 + \left(\frac{x}{2} \right)_0^1 = \frac{3}{4} \quad (\text{ب})$$

$$C_1 = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 x f(x) dx = \frac{3}{2} \int_{-1}^0 x(1+x) dx + \frac{3}{2} \int_0^1 x(1) dx = \frac{3}{2} \left(\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right)_{-1}^0 + \frac{3}{2} \left(\frac{x^2}{2} \right)_0^1 = 1$$

$$C_2 = \frac{5}{2} \int_{-1}^1 \left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2} \right) f(x) dx = \frac{5}{2} \int_{-1}^0 \left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2} \right) (x+1) dx + \frac{5}{2} \int_0^1 \left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2} \right) (1) dx = \frac{5}{2} \int_{-1}^0 \left(\frac{3}{2}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \right) dx + \frac{5}{2} \int_0^1 \left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2} \right) dx$$

$$= \frac{5}{2} \left(\frac{3}{8}x^4 + \frac{x^3}{2} - \frac{x^2}{4} - \frac{x}{2} \right)_{-1}^0 + \frac{5}{2} \left(\frac{x^3}{2} - \frac{x}{2} \right)_0^1 = -\frac{5}{16}$$

$$C_3 = \frac{7}{2} \int_{-1}^1 \left(\frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x \right) f(x) dx = \frac{7}{2} \int_{-1}^0 \left(\frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x \right) (x+1) dx + \frac{7}{2} \int_0^1 \left(\frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x \right) dx = \frac{7}{2} \left(\frac{x^5}{2} + \frac{5}{8}x^4 - \frac{x^3}{2} - \frac{3}{4}x^2 \right)_{-1}^0$$

$$+ \frac{7}{2} \left(\frac{5}{8}x^4 - \frac{3}{4}x^2 \right)_0^1 \Rightarrow C_3 = 0 \rightarrow f(x) = \frac{3}{4}P_0(x) + P_1(x) - \frac{5}{16}P_2(x)$$

2- با استفاده از روش سری ها معادله زیر را حل کنید .

$$x^2 y'' - x(x+1)y' + y = 0$$

پاسخ : رجوع کنید به کتاب معادلات دیفرانسیل دکتر نیکوکار ، صفحه 351 ، مجموعه مسائل 4.4 ، سوال 10

3- با استفاده از تغییر متغیر $y = ux^{\frac{1}{2}}$ و $z = \frac{8}{3}x^{\frac{3}{2}}$ معادله روبرو را حل کنید .

$$y'' + 16xy = 0$$

$$z = \frac{8}{3}x^{\frac{3}{2}} \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 4x^{\frac{1}{2}}, \quad y' = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}u + x^{\frac{1}{2}}\frac{du}{dx}, \quad \frac{du}{dx} = \frac{du}{dz} \times \frac{dz}{dx} = 4x^{\frac{1}{2}}\frac{du}{dz}$$

پاسخ :

$$\Rightarrow y' = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}u + 4x\frac{du}{dz}, \quad y'' = -\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}}u + 2\frac{du}{dz} + 4\frac{du}{dz} + 4x \times 4x^{\frac{1}{2}}\frac{d^2u}{dz^2}$$

با جایگذاری مقادیر روبرو در معادله داریم :

$$16x^{\frac{3}{2}}\frac{d^2u}{dz^2} + 6\frac{du}{dz} + \left(-\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}} + 16x^{\frac{3}{2}} \right)u = 0 \quad \times \frac{4}{9}x^{\frac{3}{2}} \rightarrow \frac{64}{9}x^3\frac{d^2u}{dz^2} + \frac{8}{3}x^{\frac{3}{2}}\frac{du}{dz} + \left(\frac{64}{9}x^3 - \frac{1}{9} \right)u = 0$$

$$\Rightarrow z^2\frac{d^2u}{dz^2} + z\frac{du}{dz} + \left(z^2 - \frac{1}{9} \right)u = 0 \Rightarrow u = AJ_3(z) + BY_3(z) \Rightarrow y = x^{\frac{1}{2}} \left[AJ_{\frac{1}{3}}\left(\frac{8}{3}x^{\frac{3}{2}} \right) + BY_{\frac{1}{3}}\left(\frac{8}{3}x^{\frac{3}{2}} \right) \right]$$

$$(A) \int_0^{\infty} e^{-2t} \frac{\sin t \cosh t}{t} dt$$

4- مطلوب است محاسبه

$$(B) \ell \left\{ \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(t \cos \theta) d\theta \right\}$$

پاسخ: $\int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt = F(s)$ می دانیم، $\cosh t = \frac{e^t + e^{-t}}{2} \Rightarrow A = \int_0^{\infty} \frac{e^{-t}}{2} \frac{\sin t}{t} dt + \int_0^{\infty} \frac{e^{-2t}}{2} \frac{\sin t}{t} dt$ بنابراین با فرض

$$\ell \left\{ \frac{\sin t}{t} \right\} = \int_1^{\infty} F(u) du = \int_1^{\infty} \frac{du}{1+u^2} = \tan^{-1} u \Big|_1^{\infty} = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} s \quad \lim_{t \rightarrow 0} f(t) = 1 \text{ و از آنجا که } f(t) = \frac{\sin t}{t} \text{ موجود می باشد بنابراین}$$

$$\Rightarrow \int_0^{\infty} e^{-t} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1}(1) = \frac{\pi}{4}, \quad \int_0^{\infty} e^{-3t} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} 3 \Rightarrow A = \frac{1}{2} \left(\frac{3\pi}{4} - \tan^{-1}(3) \right)$$

$$\ell \{ \cos 2t \} = \frac{s}{s^2 + 4} \Rightarrow \ell \{ \cos(t \cos \theta) \} = \frac{s}{s^2 + \cos^2 \theta} \Rightarrow (B) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{s}{s^2 + \cos^2 \theta} d\theta = \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{\sqrt{1+s^2}} \tan^{-1} \frac{s \tan \theta}{\sqrt{1+s^2}} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \quad (B)$$

چون تابع به دست آمده زوج است پس به جای $\int_0^{\frac{\pi}{2}}$ مقدار $2 \int_0^{\frac{\pi}{2}}$ محاسبه شده است.

$$\Rightarrow \ell \left\{ \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(t \cos \theta) d\theta \right\} = \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{\sqrt{1+s^2}} \right) \tan^{-1} \frac{s}{\sqrt{1+s^2}}$$

$$(A) \ell^{-1} \left[\frac{s}{(s^2 + 1)(s^2 + 4)^2} \right]$$

5- مطلوب است محاسبه

$$(B) \ell^{-1} \left[e^{-2s} \ln \frac{s}{s-1} \right]$$

$$(A) \Rightarrow \ell^{-1} \left\{ \frac{s}{(s^2 + 1)(s^2 + 4)^2} \right\} = \ell^{-1} \left\{ \frac{\frac{1}{9}s}{s^2 + 1} + \frac{-\frac{1}{9}s^3 - \frac{7}{9}s}{(s^2 + 4)^2} \right\} = \frac{1}{9} \ell^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2 + 1} \right\} - \frac{1}{9} \ell^{-1} \left\{ \frac{s^3 + 4s}{(s^2 + 4)^2} \right\} - \frac{1}{3} \ell^{-1} \left\{ \frac{s}{(s^2 + 4)^2} \right\} \quad \text{پاسخ:}$$

$$F_1(s) = \frac{s}{(s^2 + 4)^2}, \quad f(t) = t \ell^{-1} \left\{ \int_1^{\infty} \frac{u}{(u^2 + 4)^2} du \right\} = \frac{t}{2} \ell^{-1} \left\{ \left[\frac{-1}{u^2 + 4} \right]_1^{\infty} \right\} = \frac{t}{2} \ell^{-1} \frac{1}{s^2 + 4} = \frac{t}{4} \sin 2t$$

$$\Rightarrow (A) = \frac{1}{9} \cos t - \frac{1}{9} \cos 2t - \frac{t}{12} \sin 2t$$

$$(B): \ell^{-1}\{e^{-cs}F(s)\} = u_c(t)f(t-c), \quad F(s) = \ln \frac{s}{s-1} = \ln s - \ln s-1, \quad \ell^{-1}\{F'(s)\} = -tf(t)$$

$$\ell^{-1}\left\{\frac{1}{s} - \frac{1}{s-1}\right\} = 1 - e^t \Rightarrow \ell^{-1}\left\{\ln \frac{s}{s-1}\right\} = -\frac{1}{t}(1 - e^t) \Rightarrow \ell^{-1}\left\{e^{-2s} \ln \frac{s}{s-1}\right\} = -u_2(t) \frac{1}{t-2}(1 - e^{t-2})$$

6- الف) به کمک تبدیل لاپلاس معادله زیر را حل کنید.

$$t \frac{d^2 y}{dt^2} + (3t-1) \frac{dy}{dt} + (4t-9)y = 0, \quad y(0) = 0$$

ب) معادله زیر را حل کنید.

$$\int_0^t y(\lambda) y(t-\lambda) d\lambda = 16 \sin 4t$$

$$\ell\{J_0(at)\} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + s^2}} \quad \text{توجه:}$$

$$\ell\{y''\} = -F_1'(s), \quad F_1(s) = s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) = s^2 Y(s) - y'(0) \Rightarrow \ell\{y''\} = -(2sY(s) + s^2 Y'(s))$$

پاسخ:

$$\ell\{y'\} = -F_2'(s), \quad F_2(s) = sY(s) - y(0) = sY(s) \Rightarrow \ell\{y'\} = -(sY'(s) + Y(s)), \quad \ell\{ty\} = -Y'(s)$$

$$-(s^2 Y'(s) + 2sY(s)) - 3(sY'(s) + Y(s)) - sY(s) + 4Y'(s) - 9Y(s) = 0$$

با جایگذاری مقادیر فوق در معادله داریم:

$$\Rightarrow (s^2 + 3s - 4)Y'(s) + (3s + 12)Y(s) = 0 \Rightarrow \frac{dY(s)}{ds} = \frac{3}{1-s} Y(s) \Rightarrow \frac{dY(s)}{Y(s)} = \frac{3}{1-s} ds \Rightarrow \ln Y(s) = -3 \ln(1-s)$$

$$F(s) = \frac{1}{2(s-1)}, \quad F'(s) = -\frac{1}{2(s-1)^2} \quad \text{داریم: } F''(s) = \frac{1}{(1-s)^3} \quad \text{با فرض } Y(s) = (1-s)^{-3} \Leftarrow$$

$$f(t) = \ell^{-1}\left\{\frac{1}{2(s-1)}\right\} = \frac{1}{2}e^t \Rightarrow y(t) = \ell^{-1}\left\{\frac{1}{(1-s)^3}\right\} = \frac{t^2}{2}e^t, \quad \ell^{-1}\{F''(s)\} = t^2 f(t) \quad \text{اما داریم:}$$

1- به کمک سری توانی معادله زیر را حل کنید .

$$y'' + x^2 y' + 2xy = 0 \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$$

پاسخ: با جایگذاری در معادله $y''(0) + 0 + 0 = 0 \Rightarrow y''(0) = 0$ را به دست می آوریم: و با مشتق گرفتن از معادله داریم:

$$y''' + 2xy' + x^2 y'' + 2y + 2xy' = 0 \Rightarrow y'''(0) = -2, \quad y^{(4)} + 2y' + 2xy'' + x^2 y''' + 2xy'' + 2y' + 2xy'' + 2y' = 0$$

$$\Rightarrow y^{(4)} + x^2 y''' + 6xy'' + 6y' = 0 \Rightarrow y^{(4)}(0) = 0, \quad y^{(5)} + x^2 y^{(4)} + 8xy'' + 12y' = 0 \Rightarrow y^{(5)}(0) = 0$$

$$y^{(6)} + x^2 y^{(5)} + 10xy^{(4)} + 20y''' = 0 \Rightarrow y^{(6)}(0) = 40, \Rightarrow y = 1 - \frac{x^3}{3} + \frac{x^6}{18} + \dots$$

2- نقاط عادی (معمولی) و غیر عادی منظم معادله دیفرانسیل زیر را بیابید . سپس جواب متناظر با ریشه کوچکتر معادله

$$2x^2(1-x)y'' - x(1+7x)y' + y = 0$$

شاخصی را بیابید .

پاسخ: یادآوری - نقطه $x = a$ را یک نقطه بولی معادله $f_1(x)y'' + f_2(x)y' + f_3(x)y = 0$ نامیم هرگاه $f_1(a) \neq 0$ باشد.

در غیر این صورت این نقطه را منفرد گوئیم . پس نقاط معمولی معادله مجموعه روبرو می باشند .

$$\Rightarrow 2x^2(1-x) \neq 0 \Rightarrow x \neq 0, 1$$

از طرف دیگر $x = 0$ نقطه منفرد منظم معادله فوق نیز می باشد . در معادله شاخصی داریم:

$$a_0 = \lim_{x \rightarrow 0} x \times \frac{-x(1+7x)}{2x^2(1-x)} = -\frac{1}{2}$$

$$b_0 = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \times \frac{1}{2x^2(1-x)} = \frac{1}{2}, \Rightarrow r(r-1) - \frac{1}{2}r + \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow r_1 = 1, \quad r_2 = \frac{1}{2}$$

با جایگذاری مقادیر روبرو در معادله داریم:

$$\Rightarrow y = x^{\frac{1}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n, \quad y' = x^{\frac{1}{2}} \sum_{n=1}^{\infty} \left(n + \frac{1}{2}\right) C_n x^{n-1}, \quad y'' = x^{\frac{1}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \left(n^2 - \frac{1}{4}\right) C_n x^{n-2}$$

$$x^{\frac{1}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} n(2n-1) C_n x^n - (n+3)(2n+1) C_n x^{n+1} = 0$$

$$x^0 \text{ ضريب} = 0 \Rightarrow C_0 \text{ پارامتر} , x^1 \text{ ضريب} = 0 \Rightarrow -(3)(1)C_0 + (1)(1)C_1 = 0 \Rightarrow C_1 = 3C_0$$

$$x^2 \text{ ضريب} = 0 \Rightarrow -(4)(3)C_1 + (2)(3)C_2 = 0 \Rightarrow C_2 = 2C_1 = 6C_0 , x^3 \text{ ضريب} = 0 \Rightarrow -(5)(5)C_2 + (3)(5)C_3 = 0 \Rightarrow C_3 = 10C_0$$

$$\Rightarrow y = C_0 x^{\frac{1}{2}} (1 + 3x + 6x^2 + 10x^3 + \dots)$$

3-الف) اگر $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n P_n(x)$ و $-1 < x < 1$, که در آن $P_n(x)$ یک چند جمله ای لژاندر است , نشان دهید :

$$C_n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 P_n(x) f(x) dx$$

ب) چهار جمله اول بسط تابع زیر را بر حسب چند جمله ایهای لژاندر بنویسید .

$$f(x) = \begin{cases} 0 & 0 < x < 1 \\ -x & -1 < x < 0 \end{cases}$$

پاسخ : الف) به عهده دانشجوی

$$P_0(x) = 1 , P_1(x) = x , P_2(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2} , P_3(x) = \frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x$$

ب) می دانیم :

از آنجا که $f(x)$ در بازه $0 < x < 1$ صفر است , فقط به بررسی مقدار انتگرال در بازه $(-1, 0)$ می پردازیم :

$$C_0 = \frac{1}{2} \int_{-1}^0 -x dx = \left(-\frac{x^2}{4} \right)_{-1}^0 = \frac{1}{4} , C_1 = \frac{3}{2} \int_{-1}^0 (-x)(x) dx = \left(-\frac{x^3}{2} \right)_{-1}^0 = \frac{1}{2}$$

$$C_2 = \frac{5}{2} \int_{-1}^0 \left(-\frac{3}{2}x^3 + \frac{x}{2} \right) dx = -\frac{5}{2} \left(\frac{3}{8}x^4 - \frac{x^2}{4} \right)_{-1}^0 = \frac{5}{16} , C_3 = \frac{7}{2} \int_{-1}^0 \left(-\frac{5}{2}x^4 + \frac{3}{2}x^2 \right) dx = \frac{7}{2} \left(-\frac{x^5}{5} + \frac{x^3}{2} \right)_{-1}^0 = 0$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{4}P_0(x) + \frac{1}{2}P_1(x) + \frac{5}{16}P_2(x)$$

$$4-الف) \text{ مطلوبیت محاسبه } \mathcal{L} \left\{ \frac{\sin^2 t}{t} \right\} . \text{ ب) نشان دهید که } \int_0^{\infty} e^{-t} \frac{\sin^2 t}{t} dt = \frac{1}{4} \ln 5$$

$$\text{ج) مطلوب است محاسبه } \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{(s+1)e^{-s}}{(s^2+2s+2)^2} \right\}$$

پاسخ: الف) موجود است. $f(t) = \sin^2 t \Rightarrow \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin^2 t}{t} = 0$ پس $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$, $\mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t}\right\} = \int_s^\infty F(u)du$

$$\mathcal{L}\{\sin^2 t\} = \mathcal{L}\left\{\frac{1 - \cos 2t}{2}\right\} = \mathcal{L}\left\{\frac{1}{2}\right\} - \frac{1}{2}\mathcal{L}\{\cos 2t\} = \frac{1}{2s} - \frac{1}{2} \frac{s}{s^2 + 4} \Rightarrow \mathcal{L}\left\{\frac{\sin^2 t}{t}\right\} = \int_s^\infty \left(\frac{1}{2u} - \frac{1}{2u^2 + 4}\right) du = -\frac{1}{2} \ln \frac{s}{\sqrt{s^2 + 4}}$$

$$\int_0^\infty e^{-st} f(t) dt = F(s) \Rightarrow \int_0^\infty e^{-st} \frac{\sin^2 t}{t} dt = -\frac{1}{2} \ln \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{1}{4} \ln 5$$

(ب) با توجه به قسمت الف داریم:

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s-a)\} = e^{at} f(t) \Rightarrow \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{(s+1)}{((s+1)^2 + 1)^2} e^{-s}\right\} = e^{-t} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s^2 + 1)^2} e^{-\pi(s-1)}\right\}, F_1(s) = \frac{s}{(s^2 + 1)^2} = \frac{1}{s^2 + 1} \times \frac{s}{s^2 + 1} \text{ (ج)}$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{s}{s^2 + 1}\right\} = \cos t, \mathcal{L}\left\{\frac{1}{s^2 + 1}\right\} = \sin t \Rightarrow F_1(s) = \int_0^t \cos \lambda \sin(t-\lambda) d\lambda = \frac{t}{2} \sin t \Rightarrow \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+1}{(s^2 + 2s + 2)^2}\right\} = e^{-t} \left[\frac{t \sin t}{2}\right]$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{e^{-cs} F(s)\} = u_c(t) f(t-c) \Rightarrow \mathcal{L}^{-1}\left\{e^{-s} \frac{1+s}{(s^2 + 2s + 2)^2}\right\} = e^{-t} u_\pi(t) \left(\frac{\pi-t}{2} \sin t\right)$$

از طرفی

$$5- \text{الف) اگر } \mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) \text{ باشد, نشان دهید } \mathcal{L}\left\{f\left(\frac{t}{a}\right)\right\} = aF(as)$$

(ب) اگر $g(t) = \int_1^{2t} e^u f(u) du$ باشد, تبدیل لاپلاس تابع g را بر حسب تبدیل لاپلاس تابع f بیان کنید.

پاسخ: الف) رجوع کنید به صفحه 407 کتاب معادلات دیفرانسیل دکتر نیکوکار.

$$g'(t) = 2e^{2t} f(2t) - e^t f(t) \Rightarrow \mathcal{L}\{g'(t)\} = 2\mathcal{L}\{e^{2t} f(2t)\} - \mathcal{L}\{e^t f(t)\}$$

(ب) از طرفین مشتق می گیریم:

$$\Rightarrow s\mathcal{L}\{g(t)\} - g(0) = F\left(\frac{s-2}{2}\right) - F(s-1) \Rightarrow \mathcal{L}\{g(t)\} = \frac{1}{s} \left[F\left(\frac{s-2}{2}\right) - F(s-1)\right]$$

6- به کمک تبدیل لاپلاس معادله زیر را حل کنید.

$$t \frac{d^2 y}{dt^2} + (1-2t) \frac{dy}{dt} - 2y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 2$$

$$\int_0^t \frac{y(\lambda)}{\sqrt{t-\lambda}} d\lambda = 1+t+t^2. \text{ (ب) معادله انتگرالی روبرو را حل کنید.}$$

پاسخ : با استفاده از روابط به دست آمده از قبل داریم :

$$-(2sY(s) + s^2Y'(s) - 1) + 2(sY'(s) + Y(s)) + sY(s) - 1 - 2Y(s) = 0$$

$$\Rightarrow (-s^2 + 2s)Y'(s) - sY(s) = 0 \Rightarrow Y'(s) = \frac{Y(s)}{2-s} \Rightarrow \ln Y(s) = -\ln(2-s) \Rightarrow Y(s) = \frac{1}{2-s} \Rightarrow y(t) = -e^{2t}$$

(ب) از طرفین انتگرال لاپلاس می گیریم .

$$f(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \rightarrow f(t) = t^{-\frac{1}{2}} \Rightarrow \ell\{f(t)\} = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{s^{\frac{1}{2}}} = \sqrt{\frac{\pi}{s}}$$

$$\Rightarrow Y(s)\sqrt{\frac{\pi}{s}} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s^2} + \frac{2}{s^3} \Rightarrow Y(s) = \frac{1}{\pi} \left(\sqrt{\frac{\pi}{s}} + \sqrt{\frac{\pi}{s^3}} + \sqrt{\frac{\pi}{s^5}} \right), \quad \ell^{-1}\left\{\sqrt{\frac{\pi}{s}}\right\} = t^{-\frac{1}{2}}, \quad \ell^{-1}\left\{\frac{1}{s}\sqrt{\frac{\pi}{s}}\right\} = \int_0^t (t-\lambda)^{-\frac{1}{2}} d\lambda$$

$$= -2(t-\lambda)^{\frac{1}{2}} \Big|_0^t = 2t^{\frac{1}{2}}, \quad \ell^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\sqrt{\frac{\pi}{s}}\right\} = \int_0^t \lambda(t-\lambda)^{-\frac{1}{2}} d\lambda = -2\lambda(t-\lambda)^{\frac{1}{2}} - \frac{4}{3}(t-\lambda)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^t = \frac{4}{3}t^{\frac{3}{2}} \Rightarrow y(t) = \frac{1}{\pi} \left(t^{-\frac{1}{2}} + 2t^{\frac{1}{2}} + \frac{4}{3}t^{\frac{3}{2}} \right)$$

78/10/21

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

امتحان پایان ترم

1- جواب عمومی معادله زیر را بدست آورید .

$$x^2 y'' - x(1+x)y' + y = 0$$

پاسخ : رجوع کنید به کتاب معادلات دیفرانسیل دکتر نیکوکار ، صفحه 351 ، مسئله 10

2- با استفاده از تغییر متغیر داده شده معادله زیر را حل کنید .

$$y'' + xy = 0 \quad y = u\sqrt{x}, \quad \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} = z$$

$$z = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} \Rightarrow \frac{dz}{dx} = x^{\frac{1}{2}}, \quad y' = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}u + x^{\frac{1}{2}}\frac{du}{dx}, \quad \frac{du}{dx} = \frac{du}{dz} \times \frac{dz}{dx} = x^{\frac{1}{2}}\frac{du}{dz} \Rightarrow y' = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}u + x\frac{du}{dz}$$

پاسخ :

$$y'' = -\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}}u + \frac{3}{2}\frac{du}{dz} + 2x^{\frac{3}{2}} + x^{\frac{3}{2}}\frac{d^2u}{dz^2} \Rightarrow y'' + xy = \frac{3}{2}\frac{du}{dz} + x^{\frac{3}{2}}\frac{d^2u}{dz^2} + \left(x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}}\right)u = 0 \quad \text{ضرب میکنیم} \quad \frac{4}{9}x^{\frac{3}{2}}$$

$$\text{به دست می آید: } \frac{4}{9}x^3\frac{d^2u}{dz^2} + \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\frac{du}{dz} + \left(\frac{4}{9}x^3 - \frac{1}{9}\right)u = 0 \Rightarrow z^2\frac{d^2u}{dz^2} + z\frac{du}{dz} + \left(z^2 - \frac{1}{9}\right)u = 0$$

((21))

$$\Rightarrow y = x^{\frac{1}{2}} \left[A J_{\frac{1}{3}} \left(\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right) + B Y_{\frac{1}{3}} \left(\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right) \right]$$

3- الف) به کمک سری توانی معادله روبرو را حل کنید. $(1-x^2)y'' - 2xy' + \frac{3}{4}y = 0$

ب) چهار جمله اول بسط تابع زیر را بر حسب توابع لژاندر بیان کنید.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & -1 \leq x < 0 \\ 2x+1 & 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

پاسخ: الف) از آنجائیکه $x=0$ نقطه معمولی معادله می باشد، پس یک جواب معادله به صورت $y = C_0 + C_1x + C_2x^2 + \dots + C_nx^n$ می باشد، اکنون مشتق اول و دوم y را گرفته و در معادله قرار می دهیم.

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)C_{n+2}x^n - \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)C_nx^n - 2\sum_{n=0}^{\infty} C_nx^n + \frac{3}{4}\sum_{n=0}^{\infty} C_nx^n = 0$$

$$C_{n+2} = \frac{\left(n-\frac{1}{2}\right)\left(n+\frac{3}{2}\right)}{(n+2)(n+1)}C_n \text{ و رابطه } x^0 \text{ ضرب } 0 \Rightarrow C_2 = -\frac{3}{8}C_0, \quad x^1 \text{ ضرب } 0 \Rightarrow C_3 = \frac{5}{8}C_1$$

$$\Rightarrow C_4 = -\frac{21}{2^7}C_0, \quad C_5 = \frac{15}{2^7}C_1 \Rightarrow y = C_0\left(1 - \frac{3}{8}x^2 - \frac{21}{2^7}x^4\right) + C_1\left(x + \frac{5}{8}x^3 + \frac{15}{2^7}x^5\right)$$

ب) با استفاده از روابط روبرو به حل سنوال می پردازیم: $P_0(x)=1, P_1(x)=x, P_2(x)=\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}, P_3(x)=\frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x$

$$C_0 = \frac{1}{2} \int_0^1 (1)(2x+1)dx = \frac{1}{2}(x^2+x)_0^1 = 1, \quad C_1 = \frac{3}{2} \int_0^1 (2x^2+x)dx = \frac{3}{2}\left(\frac{2}{3}x^3 + \frac{x^2}{2}\right)_0^1 = \frac{7}{4}$$

$$C_2 = \frac{5}{2} \int_0^1 \left(3x^3 - \frac{3}{2}x^2 - x - \frac{1}{2}\right)dx = \frac{5}{2}\left(\frac{3}{4}x^4 - \frac{x^3}{2} - \frac{x^2}{2} - \frac{x}{2}\right)_0^1 = -\frac{15}{8}, \quad C_3 = \frac{7}{2} \int_0^1 \left(5x^4 + \frac{5}{2}x^3 - 3x^2 - \frac{3}{2}x\right)dx$$

$$\Rightarrow C_3 = \frac{7}{2}\left(x^5 + \frac{5}{8}x^4 - x^3 - \frac{3}{4}x^2\right)_0^1 = -\frac{7}{16} \Rightarrow f(x) = P_0(x) + \frac{7}{4}P_1(x) - \frac{15}{8}P_2(x) - \frac{7}{16}P_3(x)$$

4- تبدیل لاپلاس وارون های زیر را حساب کنید.

$$\ell^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+1}\ln\left(\frac{s}{s-1}\right)\right\} \quad \text{ب)}$$

$$\ell^{-1}\left\{\frac{e^{-s}(1-e^{-s})}{s(s^2+1)}\right\} \quad \text{الف)}$$

$$f(t) = \ell^{-1} \left\{ \frac{1}{s^{\frac{5}{2}}} \right\} = \frac{t^{\frac{3}{2}}}{\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)}, \quad \ell^{-1}\{F(s-b)\} = e^{bt} f(t) \Rightarrow \ell^{-1} \left\{ \frac{1}{(s+4)^{\frac{5}{2}}} \right\} = e^{-4t} \frac{t^{\frac{3}{2}}}{\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)}$$

پاسخ: الف)

$$\ell^{-1}\{e^{-cs} F(s)\} = u_c(t) f(t-c) \Rightarrow \ell^{-1} \left\{ \frac{e^{4-3s}}{(s+4)^{\frac{5}{2}}} \right\} = e^4 u_3(t) \frac{e^{4(3-t)} (t-3)^{\frac{3}{2}}}{\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)}$$

$$\ell \left\{ \int_0^t f(r) dr \right\} = \frac{1}{s} F_1(s) \Rightarrow \ell \left\{ \frac{e^{-2\lambda} - e^{-4\lambda}}{\lambda} \right\} = F_2(s+2) - F_2(s+4), \quad F_2(s) = \ell \left\{ \frac{1}{t} \right\}$$

ب)

$$\Rightarrow \ell \left\{ \int_0^t \frac{e^{-2\lambda} - e^{-4\lambda}}{\lambda} d\lambda \right\} = \frac{1}{s+2} F_2(s+2) - \frac{1}{s+4} F_2(s+4), \quad \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt = F(s)$$

$$\int_0^\infty e^{-2t} \left(\int_0^t \frac{e^{-2\lambda} - e^{-4\lambda}}{\lambda} d\lambda \right) dt = \frac{1}{4} F_2(4) - \frac{1}{6} F_2(6)$$

5- به کمک تبدیل لاپلاس معادله زیر را حل کنید.

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - t \frac{dy}{dt} + y = 1 \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 2$$

$$\ell\{y''\} = (s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0)) = (s^2 Y(s) - s - 2), \quad \ell\{y'\} = -(sY'(s) + Y(s))$$

پاسخ: با قرار دادن مقادیر روبرو در معادله:

$$\Rightarrow s^2 Y(s) - s - 2 + sY'(s) + Y(s) = \frac{1}{s} \Rightarrow Y'(s) + \left(\frac{s+2}{s} \right) Y(s) = 1 + \frac{2}{s} + \frac{1}{s^2} \rightarrow \text{معادله خطی}$$

$$\mu(s) = e^{\int \left(\frac{s+2}{s} \right) ds} = s^2 e^{\frac{s^2}{2}} \Rightarrow Y(s) = s^{-2} e^{-\frac{s^2}{2}} \int \left(s^2 e^{\frac{s^2}{2}} + e^{\frac{s^2}{2}} + 2s e^{\frac{s^2}{2}} \right) ds \Rightarrow Y(s) = \frac{1}{s} + \frac{2}{s^2} \Rightarrow y(t) = 1 + 2t$$

$$\begin{cases} y_1'' - y_2' = \cos t \\ y_1' + y_2'' = -\sin t \end{cases} \quad y_1(0) = y_2(0) = 1, \quad y_1'(0) = y_2'(0) = 0$$

6- دستگاه روبرو را حل کنید.

$$y_1(t) = t \sin t \quad \text{پس} \quad Y_2(s) = \frac{s^2 - 1}{(s^2 + 1)^2} \Rightarrow y_2(t) = \ell^{-1} \left\{ \frac{s^2 - 1}{(s^2 + 1)^2} \right\} = t \cos t$$

و با قرار دادن در معادله به دست می آید:

$$\int f ds = f(s)$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{3}P_0(x) + \frac{3}{5}P_1(x) - \frac{2}{3}P_2(x) + \frac{2}{5}P_3(x) \Rightarrow \int_{-1}^1 f(x)P_n(x)dx = \frac{1}{3} \int_{-1}^1 [P_0(x)]^2 dx + \frac{3}{5} \int_{-1}^1 [P_1(x)]^2 dx - \frac{2}{3} \int_{-1}^1 [P_2(x)]^2 dx + \frac{2}{5} \int_{-1}^1 [P_3(x)]^2 dx = \frac{1}{3}(2) + \frac{3}{5}\left(\frac{2}{3}\right) - \frac{2}{3}\left(\frac{2}{5}\right) + \frac{2}{5}\left(\frac{2}{7}\right) = \frac{32}{35}$$

2- یک جواب معادله زیر را حول نقطه $x=0$ به دست آورید. این نقطه چه نوع نقطه ای است؟ سپس فرم جواب دوم آن را بنویسید.

$$x^2(1+x)y'' + x(x-4)y' + 4y = 0$$

پاسخ: رجوع کنید به کتاب معادلات دیفرانسیل دکتر نیکوکار، صفحه 351، سنوال 16

3- اگر $J_\nu(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(n+\nu+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+\nu}$ باشد، الف) فقط یکی از دو رابطه زیر را ثابت کنید.

$$\frac{d}{dx}(x^\nu J_\nu(x)) = x^\nu J_{\nu-1}(x), \quad \frac{d}{dx}(x^{-\nu} J_\nu(x)) = -x^{-\nu} J_{\nu+1}(x)$$

ب) انتگرال روبرو را محاسبه نمایید.

$$\int x^2 J_0(x) dx$$

پاسخ: اثبات قسمت الف در صفحه 362 کتاب معادلات دیفرانسیل دکتر نیکوکار موجود است.

ب) $I = \int x^2 J_0(x) dx$, $u = x \rightarrow du = dx$, $x J_0(x) dx = dv \rightarrow v = x J_1(x) \Rightarrow I = x^2 J_1(x) - \int x J_1(x) dx$

$S = \int x J_1(x) dx$, $x = u \rightarrow dx = du$, $J_1(x) dx = dv \rightarrow v = -J_0(x) \Rightarrow S = -x J_0(x) + \int J_0(x) dx$

$\Rightarrow \int x^2 J_0(x) dx = x^2 J_1(x) + x J_0(x) - \int J_0(x) dx$

4- الف) لاپلاس وارون $\ell^{-1} \left\{ \frac{e^{4-3s}}{(s+4)^4} \right\}$ را حساب کنید.

ب) انتگرال روبرو را محاسبه کنید.

$$\int_0^{\infty} e^{-2t} \left(\int_0^t \frac{e^{-2\lambda} - e^{-4\lambda}}{\lambda} d\lambda \right) dt$$

79/3/24

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

امتحان پایان ترم

$$1 - \text{با توجه به رابطه مولد} \quad \frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)t^n$$

$$\text{الف) نشان دهید: } (x-t) \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)t^n = (1-2xt+t^2) \sum_{n=1}^{\infty} nP_n(x)t^{n-1}$$

ب) با مساوی قرار دادن ضرایب t^n در قسمت قبل فرمول بازگشتی زیر را به دست آورید.

$$(n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x)$$

$$\text{ج) انتگرال روبرو را محاسبه کنید.} \quad \int_{-1}^1 (x^3 - 2x^2 + 1)P_n(x)dx$$

پاسخ: الف) از طرفین رابطه بالا نسبت به t مشتق می گیریم.

$$\frac{(x-t)}{(1-2xt+t^2)^{3/2}} = \sum_{n=0}^{\infty} nP_n(x)t^{n-1} \Rightarrow \frac{x-t}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = (1-2xt+t^2) \sum_{n=0}^{\infty} nP_n(x)t^{n-1} \Rightarrow (x-t) \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)t^n = (1-2xt+t^2) \sum_{n=1}^{\infty} nP_n(x)t^{n-1}$$

$$\text{ب) رابطه فوق را به صورت مقابل خلاصه می کنیم:} \quad \sum_{n=0}^{\infty} xP_n(x)t^n - \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)t^{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} nP_n(x)t^{n-1} - \sum_{n=0}^{\infty} 2nxP_n(x)t^n + \sum_{n=0}^{\infty} nP_n(x)t^{n+1}$$

$$xP_n(x) - P_{n-1}(x) = (n+1)P_{n+1}(x) - 2nxP_n(x) + (n-1)P_{n-1}(x) \quad \text{با مساوی قرار دادن ضرایب } t \text{ هم توان داریم:}$$

$$\text{و } (n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x) \text{ به دست می آید.}$$

$$P_0(x)=1 \quad P_1(x)=x \quad P_2(x)=\frac{3}{2}x-\frac{1}{2} \quad P_3(x)=\frac{5}{2}x^3-\frac{3}{2}x \quad \text{ج) تابع از درجه 3 می باشد پس با روابط روبرو داریم:}$$

$$C_0 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (x^3 - 2x^2 + 1)dx = \frac{1}{2} \left(\frac{x^4}{4} - \frac{2}{3}x^3 + x \right)_{-1}^1 = \frac{1}{3}, \quad C_1 = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 (x^4 - 2x^3 + x)dx = \frac{3}{2} \left(\frac{x^5}{5} - \frac{x^4}{2} + \frac{x^2}{2} \right)_{-1}^1 = \frac{3}{5}$$

$$C_2 = \frac{5}{2} \int_{-1}^1 \left(\frac{3}{2}x^5 - \frac{x^3}{2} - 3x^4 + \frac{3}{2}x^2 + x^2 - \frac{1}{2} \right)dx = \frac{5}{2} \left(\frac{x^6}{4} - \frac{x^4}{8} - \frac{3}{5}x^5 + \frac{x^3}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x}{2} \right)_{-1}^1 = -\frac{2}{3}$$

$$C_3 = \frac{7}{2} \int_{-1}^1 \left(\frac{5}{2}x^6 - 5x^5 + \frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x^4 + 3x^3 - \frac{3}{2}x \right)dx = \frac{7}{2} \left(\frac{5}{14}x^7 - \frac{5}{6}x^6 - \frac{5}{8}x^4 - \frac{3}{10}x^5 + \frac{3}{4}x^4 - \frac{3}{4}x^2 \right)_{-1}^1 = \frac{2}{5}$$

((24))

$$\Rightarrow \ell^{-1} \left\{ \frac{e^{-s}}{s(1+s^2)} \right\} - \ell^{-1} \left\{ \frac{e^{-2s}}{s(1+s^2)} \right\} = \ell^{-1} \left\{ e^{-s} \left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+1} \right) \right\} - \ell^{-1} \left\{ e^{-2s} \left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+1} \right) \right\}, \quad \ell^{-1} \left\{ \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+1} \right\} = 1 - \cos t \quad (\text{پاسخ: الف})$$

$$\ell^{-1} \{ e^{-cs} F(s) \} = u_c(t) f(t-c) \Rightarrow \ell^{-1} \left\{ e^{-s} \frac{1}{s(1+s^2)} \right\} = u_1(t) (1 - \cos(t-1)), \quad \ell^{-1} \left\{ \frac{e^{-2s}}{s(1+s^2)} \right\} = u_2(t) (1 - \cos(t-2))$$

$$\Rightarrow \ell^{-1} \left\{ \frac{e^{-s}(1-e^{-s})}{s(1+s^2)} \right\} = u_1(t) (1 - \cos(t-1)) - u_2(t) (1 - \cos(t-2))$$

ب) از مسائل قبل داریم: $\ell^{-1} \left\{ \ln \frac{s}{s-1} \right\} = \frac{e^t - 1}{t}$ و همین طور $\ell^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2+1} \right\} = \cos t$ می باشد. اکنون با استفاده از کنولوشن

داریم: $\int_0^t \frac{e^{t-\lambda} - 1}{t-\lambda} \times \cos \lambda \, d\lambda = \ell^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2+1} \ln \frac{s}{s-1} \right\}$ از آنچه که انتگرال به صورت $\int_t^t \frac{e^t}{t} dt$ قابل قبول است.

5-الف) اگر $f(t)$ متناوب با دوره تناوب p باشد، (یعنی $f(t+p) = f(t)$) نشان دهید.

$$F(s) = \frac{1}{1-e^{-ps}} \int_0^p e^{-st} f(t) dt$$

ب) تبدیل لاپلاس $\ell \{ \sin(kt) \}$ را حساب کنید.

پاسخ: از موارد امتحانی حذف شده است.

$$\begin{cases} y_1' + y_2' = 2 \sinh(t) \\ y_2' + y_3' = e^t \\ y_3' + y_1' = 2e^t + e^{-t} \end{cases} \quad y_1(0) = 1 = y_2(0), \quad y_3(0) = 0$$

6- دستگاه روبرو را حل کنید.

پاسخ: رجوع کنید به کتاب معادلات دیفرانسیل دکتر نیکوکار، صفحه 472

چون تفاضل ریشه های معادله شاخصی صحیح است پس : $y_2 = ky_1 \ln x + x^{-2} \sum_{n=0}^{\infty} A_n x^n$ و جواب عمومی $y = Ay_1 + By_2$ می باشد.

3- الف) تابع زیر را بر حسب تابع پله ای واحد بیان نمائید و سپس تبدیل لاپلاس آنرا به دست آورید.

$$f(t) = \begin{cases} \sin t & t < \pi \\ t & t > \pi \end{cases}$$

$$g(t) = t^2 e^{2t} \int_0^t e^{-t} \frac{\sin 5t}{t} dt$$

ب) تبدیل لاپلاس تابع روبرو را بیابید.

$$f(t) = u_0(t) \sin t + u_{\pi}(t) - u_{\pi}(t) \sin t = \sin t + u_{\pi}(t)(1 - \sin t) \Rightarrow \ell\{f(t)\} = \ell\{\sin t\} + \ell\{u_{\pi}(t)(1 - \sin t)\} \quad \text{پاسخ : الف)}$$

$$\Rightarrow \ell\{f(t)\} = \frac{1}{1+s^2} + e^{-\pi s} \ell\{t + \pi\} - e^{-\pi s} \ell\{\sin(t + \pi)\} = \frac{1}{s^2+1} + e^{-\pi s} \left(\frac{1}{s^2} + \frac{\pi}{s} + \frac{1}{s^2+1} \right)$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 5t}{t} = 5 \rightarrow \text{موجود است} \Rightarrow \ell\left\{\frac{\sin 5t}{t}\right\} = \int_s^{\infty} F(u) du, \quad F(s) = \ell\{\sin 5t\} = \frac{5}{s^2+25} \Rightarrow \ell\left\{\frac{\sin 5t}{t}\right\} = \int_s^{\infty} \frac{5}{u^2+25} du \quad \text{ب)}$$

$$\Rightarrow \ell\left\{\frac{\sin 5t}{t}\right\} = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \frac{s}{5}, \quad \ell\{e^{bt} f(t)\} = F(s-b) \Rightarrow \ell\left\{e^{-t} \frac{\sin 5t}{t}\right\} = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \frac{s+1}{5}, \quad \int_0^t f(r) dr = \frac{1}{s} F(s)$$

$$\Rightarrow \ell\left\{\int_0^t e^{-t} \frac{\sin 5t}{t} dt\right\} = \frac{1}{s+1} \left(\frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \frac{s+1}{5} \right) \Rightarrow \ell\left\{e^{2t} \int_0^t e^{-t} \frac{\sin 5t}{t} dt\right\} = \frac{1}{s-1} \left(\frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \frac{s-1}{5} \right)$$

$$\ell\{t^2 f(t)\} = F''(s) \Rightarrow \ell\{g(t)\} = \left[\frac{1}{s-1} \left(\frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \frac{s-1}{5} \right) \right]''$$

$$\ell^{-1}\left\{\frac{1}{s^3+1}\right\} \quad \text{ب)} \quad \ell^{-1}\left\{\ln \frac{s+\sqrt{s^2+1}}{2s}\right\} \quad \text{4- مطلوب است محاسبه : الف)}$$

$$F(s) = \ln \frac{s+\sqrt{s^2+1}}{2s} = \ln(s+\sqrt{s^2+1}) - \ln 2s \Rightarrow F'(s) = \frac{1}{\sqrt{1+s^2}} - \frac{1}{s} \Rightarrow \ell^{-1}\{F'(s)\} = J_0(t) - 1 \quad \text{پاسخ : الف)}$$

$$\ell^{-1}\{F'(s)\} = -tf(t) \Rightarrow \ell^{-1}\left\{\ln \frac{s+\sqrt{s^2+1}}{2s}\right\} = \frac{1}{t}(1 - J_0(t))$$

80/4/11

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

امتحان پایان ترم

1- الف) نشان دهید با استفاده از تغییر متغیر $y = x^{-\frac{1}{2}}u$ معادله $x^2y'' + xy' + (x^2 - a^2)y = 0$ را به معادله $u'' + f(x)u = 0$ تبدیل می کند. (ب) با استفاده از قسمت قبل نشان دهید:

$$J_{\frac{1}{2}}(x) = \sqrt{\frac{2}{x\pi}} \sin x$$

تبدیل می کند. (ب) با استفاده از قسمت قبل نشان دهید:

$$y = ux^{-\frac{1}{2}} \Rightarrow y' = u'x^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}ux^{-\frac{3}{2}} \Rightarrow y'' = u''x^{-\frac{1}{2}} - u'x^{-\frac{3}{2}} + \frac{3}{4}ux^{-\frac{5}{2}}$$

پاسخ:

$$\Rightarrow x^{\frac{3}{2}}u'' - x^{\frac{1}{2}}u' + \frac{3}{4}ux^{-\frac{1}{2}} + u'x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}ux^{-\frac{1}{2}} + (x^2 - a^2)x^{-\frac{1}{2}}u = 0 \Rightarrow x^{\frac{3}{2}}u'' + \left(x^{\frac{3}{2}} + x^{-\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{4} - a^2\right)\right)u = 0$$

$$u'' + \left(1 + \left(\frac{1}{4} - a^2\right)x^{-\frac{1}{2}}\right)u = 0 = u'' + f(x)u = 0$$

با ضرب رابطه فوق در $x^{-\frac{3}{2}}$ داریم:

(ب) رجوع کنید به کتاب معادلات دیفرانسیل دکتر نیکوکار، صفحه 366، مجموعه مسائل 4، 6، مسئله 2

2- به کمک سری توانی در همسایگی $x = 0$ یک جواب معادله زیر را به دست آورده و سپس فقط فرم جواب دوم و جواب

$$xy'' + 3y' - x^2y = 0$$

عمومی آن را بنویسید.

$$a_0 = \lim_{x \rightarrow 0} x \times \frac{3}{x} = 3, \quad b_0 = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \times \frac{-x^2}{x} = 0 \Rightarrow r(r-1) + 3r = 0 \Rightarrow r_1 = 0, \quad r_2 = -2$$

پاسخ:

$$\Rightarrow y_1 = x^0 \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n, \quad y_1' = \sum_{n=1}^{\infty} n C_n x^{n-1}, \quad y_1'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) C_n x^{n-2}$$

$$x^0 \text{ ضرب} = 0 \Rightarrow (1)(3)C_1 = 0 \rightarrow C_1 = 0 \quad \text{بنابراین} \quad \sum n(n+2)C_n x^{n-1} - \sum C_n x^{n+2} = 0$$

؟

$$x^2 \text{ ضرب} = 0 \Rightarrow (3)(5)C_3 - C_0 = 0 \rightarrow C_3 = \frac{1}{15}C_0, \quad x^1 \text{ ضرب} = 0 \Rightarrow (2)(4)C_2 = 0 \rightarrow C_2 = 0$$

$$x^4 \text{ ضرب} = 0 \Rightarrow (5)(7)C_5 - C_2 = 0 \rightarrow C_5 = 0, \quad x^3 \text{ ضرب} = 0 \Rightarrow (4)(6)C_4 - C_1 = 0 \rightarrow C_4 = 0$$

$$x^5 \text{ ضرب} = 0 \Rightarrow (6)(8)C_6 - C_3 = 0 \rightarrow C_6 = \frac{1}{3 \times 5 \times 8 \times 6} C_0, \quad \Rightarrow y_1 = C \left(1 + \frac{x^3}{15} + \frac{x^6}{720} + \dots \right)$$

((27))

$$\ell^{-1}\left\{\frac{1}{s^3+1}\right\} = \ell^{-1}\left\{\frac{1}{(s+1)(s^2-s+1)}\right\} = \frac{1}{3}\ell^{-1}\left\{\frac{1}{s+1} - \frac{s-2}{s^2-s+1}\right\} = \frac{1}{3}\ell^{-1}\left\{\frac{1}{s+1}\right\} - \frac{1}{3}\ell^{-1}\left\{\frac{s-\frac{1}{2}}{\left(s-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}}\right\} + \frac{1}{2}\ell^{-1}\left\{\frac{1}{\left(s-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}}\right\} \quad (ب)$$

$$\Rightarrow \ell^{-1}\left\{\frac{1}{s^3+1}\right\} = \frac{1}{3}e^{-t} - e^{\frac{t}{2}}\left(\frac{1}{3}\right)\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t + \frac{1}{2}e^{\frac{t}{2}}\frac{2}{\sqrt{3}}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t$$

$$\int_0^t \frac{y(\lambda)}{(t-\lambda)^{\frac{1}{3}}} d\lambda = t(1+t)$$

5- معادله انتگرال روبرو را حل کنید .

$$Y(s) \times \frac{\Gamma\left(\frac{2}{3}\right)}{s^{\frac{2}{3}}} = \frac{1}{s^2} + \frac{2}{s^3} \Rightarrow Y(s) = \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \left(\frac{1}{s^{\frac{4}{3}}} + \frac{1}{s^{\frac{7}{3}}} \right)$$

پاسخ : با استفاده از کاتولوشن داریم :

$$\Rightarrow y(t) = \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \left(\frac{t^{\frac{1}{3}}}{\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)} + \frac{t^{\frac{4}{3}}}{\Gamma\left(\frac{4}{3}\right)} \right)$$

و در پایان عبارت روبرو را ساده می کنیم .

$$\begin{cases} y' + 2y + 6 \int_0^t x(t) dt = -2u_0(t) & y(0) = -5, \quad x(0) = 6 \\ y' + x' + x = 0 \end{cases}$$

6- y را از دستگاه روبرو بیابید .

$$\Rightarrow \begin{cases} sY(s) + 5 + 2Y(s) + \frac{6}{s}X(s) = -\frac{2}{s} \\ sY(s) - 5 + sX(s) - 6 + X(s) = 0 \end{cases}$$

پاسخ : از هر دو معادله لاپلاس می گیریم .

$$\begin{cases} s^2Y(s) + 5s + 2sY(s) + 6X(s) = -2 \\ sY(s) + sX(s) - 1 + X(s) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (s^2 + 2s)Y(s) + 6X(s) = -2 - 5s \\ sY(s) + (s+1)X(s) = 1 \end{cases}$$

طرفین معادله بالائی را در s ضرب می کنیم .

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{\begin{vmatrix} -2-5s & 6 \\ 1 & s+1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} s^2+2s & 6 \\ s & s+1 \end{vmatrix}} = -\frac{5s^2+7s+8}{s^3+3s^2-4s} = \frac{8}{s} - \frac{10}{s-1} - \frac{49}{s+5} \Rightarrow y(t) = \frac{8}{3} - \frac{10}{3}e^t - \frac{49}{15}e^{-5t}$$

80/10/24

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

امتحان پایان ترم

1- اگر معادلات زیر

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + 12y = 0 \quad \text{و} \quad (1-x^2)y'' - 2xy' + 20y = 0$$

به ترتیب دارای جواب های y_1 و y_2 باشند، مطلوب است محاسبه

$$\int_{-1}^1 y_1^2 dx \quad \text{ب)} \quad \int_{-1}^1 y_1 y_2 dx \quad \text{الف)}$$

پاسخ: هر دو معادله فوق لژاندر بوده و جواب ها برحسب چند جمله ائهای لژاندر بیان می شوند. در معادله نخست $v(v+1) = 20 \rightarrow v = 4$ و در دومی $v(v+1) = 12 \rightarrow v = 3$ می باشد. در نتیجه $y_1 = P_4(x)$ و $y_2 = P_3(x)$ می باشند.

$$\int_{-1}^1 y_1^2 dx = \int_{-1}^1 [P_4(x)]^2 dx = \frac{2}{9} \quad \text{ب)} \quad \int_{-1}^1 y_1 y_2 dx = \int_{-1}^1 P_4(x) P_3(x) dx = 0 \quad \text{الف)}$$

2- در معادله $2(x-3)^2 xy'' + 3xy' + (x-3)y = 0$ نقاط معمولی و منفرد منظم و منفرد نامنظم را مشخص کنید، سپس ریشه های معادله شاخصی را تعیین و جواب اول معادله را به دست آورید. فقط فرم جواب دوم را بنویسید.

پاسخ: نقاط معمولی $x \neq 0, 3$ و $2(x-3)^2 x \neq 0 \Rightarrow x \neq 0, 3$ ، نقطه منفرد منظم است زیرا $x = 0$ و $x^2 \frac{x-3}{2x(x-3)^2}$ و $x \frac{3x}{2(x-3)^2 x}$ در

$$a_0 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{2x(x-3)^2} = 0, \quad b_0 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(x-3)}{2x(x-3)^2} = 0 \Rightarrow r = 0, 1$$

$x = 0$ تعریف شده اند و $x = 3$ منفرد نامنظم است.

$$\Rightarrow y_1 = x^0 \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n, \quad y_1' = \sum_{n=1}^{\infty} n C_n x^{n-1}, \quad y_1'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) C_n x^{n-2}$$

$$\Rightarrow 2 \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) C_n x^{n+1} - 12 \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) C_n x^n - 18 \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) C_n x^{n-1} + 3 \sum_{n=0}^{\infty} n C_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+1} - 3 \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = 0$$

$$x^1 \text{ ضریب } = 0 \Rightarrow -18C_2 = 0 \rightarrow C_2 = 0, \quad x^0 \text{ ضریب } = 0 \Rightarrow -3C_0 = 0 \rightarrow C_0 = 0$$

((30))

$$x^2 \text{ ضریب} = 0 \Rightarrow -(12)(2)C_2 - 18(3)(2)C_3 + 6C_2 + C_1 - 3C_2 = 0 \rightarrow C_3 = \frac{1}{3 \times 36} C_1$$

$$\Rightarrow y_1 = C \left(x + \frac{1}{3 \times 36} x^3 + \dots \right), \quad y_2 = k y_1 \ln x + x \sum_{n=0}^{\infty} A_n x^n, \quad y = A y_1 + B y_2$$

$$f(t) = t e^{-t} + \int_0^t \lambda f(t-\lambda) e^{-\lambda} d\lambda \quad \text{3- معادله رو بر و را حل کنید.}$$

پاسخ: با فرض $g(\lambda) = e^{-\lambda}$ و با استفاده از کانولوشن داریم:

$$\ell\{f(t)\} = \ell\{e^{-t}\} + \ell\{f(t)\} \times \ell\{e^{-t}\} \Rightarrow \ell\{f(t)\} = \frac{\ell\{e^{-t}\}}{1 - \ell\{e^{-t}\}}$$

$$\ell\{f(t)\} = -F'(s) \Rightarrow \ell\{e^{-t}\} = -\left(\frac{1}{s+1}\right) = \frac{1}{(s+1)^2} \Rightarrow \ell\{f(t)\} = \frac{\frac{1}{(s+1)^2}}{1 - \frac{1}{(s+1)^2}} = \frac{1}{(s+1)^2 - 1}$$

$$\Rightarrow f(t) = \ell^{-1}\left\{\frac{1}{(s+1)^2 - 1}\right\} = e^{-t} \sinh(t)$$

4- مطلوب است محاسبه:

$$\ell^{-1}\left\{\frac{e^{-2s}}{s^2 + 2s + 5}\right\} \quad \text{(الف)}$$

$$\ell^{-1}\left\{\frac{s}{(s^2 + 1)^2} \cot^{-1}(s+3)\right\} \quad \text{(ب)}$$

پاسخ: الف)

$$\ell^{-1}\left\{\frac{e^{-2s}}{s^2 + 2s + 5}\right\} = \ell^{-1}\left\{\frac{e^{-2s}}{(s+1)^2 + 4}\right\}, \quad F(s) = \frac{1}{(s+1)^2 + 4} \Rightarrow \ell^{-1}\{F(s)\} = e^{-t} \sin 2t$$

$$\Rightarrow \ell^{-1}\left\{\frac{e^{-2s}}{s^2 + 2s + 5}\right\} = u_2(t) f(t-2) = u_2(t) e^{-(t-2)} \sin 2(t-2)$$

ب)

$$F(s) = \cot^{-1}(s+3) \Rightarrow F'(s) = -\frac{1}{(s+3)^2 + 1} \Rightarrow \ell^{-1}\{F'(s)\} = -tf(t) = -e^{-3t} \sin t \Rightarrow \ell\{\cot^{-1}(s+3)\} = \frac{e^{-3t}}{t} \sin t$$

از مثال های قبل به دست آوردیم $\ell^{-1}\left\{\frac{s}{(s^2 + 1)^2}\right\} = \frac{t}{4} \sin 2t$ پس با استفاده از کانولوشن داریم:

$$\ell^{-1}\left\{\frac{s}{(s^2 + 1)^2} \cot^{-1}(s+3)\right\} = \int_0^t \left(\frac{t-\lambda}{4}\right) \sin(2t-2\lambda) e^{-3\lambda} \frac{\sin \lambda}{\lambda} d\lambda$$

5- معادله روبرو را با استفاده از تبدیل لاپلاس حل کنید. $t \frac{d^2 y}{dt^2} - (2+t) \frac{dy}{dt} + 3y = t-1$, $y(0)=0$

پاسخ: از طرفین لاپلاس می گیریم.

$$\Rightarrow -(2sY(s) + s^2 Y'(s)) + (sY'(s) + Y(s)) - 2sY(s) + 3Y(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s}$$

که یک معادله خطی می باشد، بنابراین:

$$\Rightarrow (-s^2 + s)Y'(s) + (4 - 4s)Y(s) = \frac{1-s}{s^2} \Rightarrow Y'(s) + \frac{4}{s}Y(s) = \frac{1}{s^3}$$

چون $\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 0$ پس ثابت c را می توان صفر اختیار کرد.

$$\mu(s) = e^{\int \frac{4}{s} ds} = s^4 \Rightarrow Y(s) = s^{-4} \int s ds = \frac{c}{s^4} + \frac{1}{2s^2}$$

داریم:

$$y(t) = t^{-1} \left\{ \frac{1}{2} \times \frac{1}{s^2} \right\} = \frac{t}{2}$$

82/4/2

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

امتحان پایان ترم

1- الف) نشان دهید که معادله لژاندر را می توان به صورت زیر نوشت.

$$[(1-x^2)y']' = -v(v+1)y$$

ب) با استفاده از قسمت قبل یا هر روش دیگر نشان دهید که برای هر دو چند جمله ای لژاندر $P_m(x)$ و $P_n(x)$

که $m \neq n$ داریم:

$$\int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = 0$$

پاسخ: الف) معادله لژاندر به صورت روبرو می باشد.

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + v(v+1)y = 0 \Rightarrow p = 1-x^2, \quad q = y'$$

$$\Rightarrow \frac{dp}{dx} = -2x, \quad \frac{dq}{dx} = y'', \quad p \frac{dq}{dx} + q \frac{dp}{dx} + v(v+1)y = 0 \Rightarrow \frac{d}{dx}(pq) = -v(v+1)y \Rightarrow [(1-x^2)y']' = -v(v+1)y$$

ب) رجوع کنید به صفحه 320 کتاب معادلات دیفرانسیل دکتر نیکوکار.

2- می دانیم که تابع

$$y_1 = 1 - \frac{1}{3^2} x^3 + \frac{1}{3^4 (2!)^2} x^6 - \frac{1}{3^6 (3!)^2} x^9 + \dots$$

یک جواب معادله $xy'' + y' + x^2 y = 0$ است. جواب دیگر آنرا بیابید.

پاسخ: نقطه $x = 0$ یک نقطه منفرد منظم می باشد (خودتان این مطلب را ثابت کنید). در نتیجه داریم:

$$a_0 = \lim_{x \rightarrow 0} x \times \frac{1}{x} = 1, \quad b_0 = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \times \frac{x^2}{x} = 0 \Rightarrow \text{معادله شاخصی} = r(r-1) + a_0 r + b_0 = r(r-1) + r = 0 \Rightarrow r = 0$$

از آنجا که $r_1 = r_2 = 0$ است پس فرم جواب دوم به صورت روبرو می باشد.

$$y_2 = y_1 \ln x + x^0 \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$$

با جایگذاری مقادیر روبرو داریم:

$$\Rightarrow y_2' = y_1' \ln x + \frac{y_1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} n C_n x^{n-1}, \quad y_2'' = y_1'' \ln x + \frac{2}{x} y_1' - \frac{1}{x^2} y_1 + \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) C_n x^{n-2}$$

$$\Rightarrow xy_2'' + y_2' + x^2 y_2 = 0 \Rightarrow xy_1'' \ln x + 2y_1' - \frac{1}{x} y_1 + x \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) C_n x^{n-2} + y_1' \ln x + \frac{y_1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} n C_n x^{n-1} + x^2 y_1 \ln x + x^2 \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$$

چون y_1 یک ریشه معادله است پس ضرایب $\ln x$ صفر است و با ساده کردن عبارت فوق خواهیم داشت:

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) C_n x^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} n C_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+2} + 2y_1' = 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n^2 C_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+2} = -2y_1'$$

$$-2y_1' = \frac{1}{3} x^2 - \frac{1}{54} x^5 + \frac{1}{3^4 (3!)^2} x^8 + \dots \Rightarrow x^0 \text{ ضریب } (1)^2 C_1 = 0 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$x \text{ ضریب } = 2^2 C_2 = 0 \Rightarrow C_2 = 0, \quad x^2 \text{ ضریب } = 9C_3 + C_0 = \frac{1}{3}, \quad x^3 \text{ ضریب } = 16C_4 + C_1 = 0 \Rightarrow C_4 = 0$$

$$x^5 \text{ ضریب } = 36C_6 + C_3 = -\frac{1}{54}, \quad x^8 \text{ ضریب } = 81C_9 + C_6 = \frac{1}{3^4 (3!)^2}$$

به طور مشابه مقادیر C_5 و C_7 و C_8 و ... نیز صفر می شوند.

$$\Rightarrow C_3 = \frac{1}{3^3} - \frac{1}{3^2} C_0, \quad C_6 = -\frac{1}{3^5 \times 2^3} - \frac{1}{3^2 \times 2^2} C_3 = \frac{1}{3^4 \times 2^2} C_0 + \frac{1}{3^5 \times 2^3}$$

$$\Rightarrow C_9 = \frac{1}{3^{10} \times 2^2} - \frac{1}{3^4} C_6 \Rightarrow C_9 = -\frac{1}{3^{10} \times 2^3} - \frac{1}{3^8 \times 2^2} C_0$$

پس جواب دوم به فرم زیر است.

$$y_2 = \ln x \times y_1 + C_0 \left(1 - \frac{1}{3^2} x^3 + \frac{1}{3^4 \times 2^2} x^6 - \frac{1}{3^8 \times 2^2} x^9 + \dots \right) + \frac{1}{3^3} x^3 + \frac{1}{3^5 \times 2^3} x^6 - \frac{1}{3^{10} \times 2^3} x^9 + \dots$$

5- معادله روبرو را با استفاده از تبدیل لاپلاس حل کنید. $t \frac{d^2 y}{dt^2} - (2+t) \frac{dy}{dt} + 3y = t-1$, $y(0) = 0$

پاسخ: از طرفین لاپلاس می گیریم. $\Rightarrow -(2sY(s) + s^2 Y'(s)) + (sY'(s) + Y(s)) - 2sY(s) + 3Y(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s}$

که یک معادله خطی می باشد، بنابراین: $\Rightarrow (-s^2 + s)Y'(s) + (4 - 4s)Y(s) = \frac{1-s}{s^2} \Rightarrow Y'(s) + \frac{4}{s}Y(s) = \frac{1}{s^3}$

$\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 0$ چون $\mu(s) = e^{\int \frac{4}{s} ds} = s^4 \Rightarrow Y(s) = s^{-4} \int ds = \frac{c}{s^4} + \frac{1}{2s^2}$ پس ثابت c را می توان صفر اختیار کرد.

داریم: $y(t) = \ell^{-1} \left\{ \frac{1}{2} \times \frac{1}{s^2} \right\} = \frac{t}{2}$

82/4/2

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

امتحان پایان ترم

1- الف) نشان دهید که معادله لژاندر را می توان به صورت زیر نوشت. $[(1-x^2)y']' = -v(v+1)y$

ب) با استفاده از قسمت قبل یا هر روش دیگر نشان دهید که برای هر دو چند جمله ای لژاندر $P_m(x)$ و $P_n(x)$

که $m \neq n$ داریم: $\int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = 0$

پاسخ: الف) معادله لژاندر به صورت روبرو می باشد. $(1-x^2)y'' - 2xy' + v(v+1)y = 0 \Rightarrow \overset{q}{p} = 1-x^2$, $q = y'$

$\Rightarrow \frac{dp}{dx} = -2x$, $\frac{dq}{dx} = y''$, $p \frac{dq}{dx} + q \frac{dp}{dx} + v(v+1)y = 0 \Rightarrow \frac{d}{dx}(pq) = -v(v+1)y \Rightarrow [(1-x^2)y']' = -v(v+1)y$

ب) رجوع کنید به صفحه 320 کتاب معادلات دیفرانسیل دکتر نیکوکار.

3- لاپلاس و لاپلاس وارون های زیر را بیابید :

$$\ell^{-1} \left[\frac{1}{(s-1)^3(s^3+1)} \right] \quad \text{ب)}$$

$$\ell[e^{3t} \cos 3t \cos 4t] \quad \text{الف)}$$

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)] \Rightarrow \cos 3t \cos 4t = \frac{1}{2} [\cos 7t + \cos t] \quad \text{پاسخ : الف)}$$

$$\ell\{e^{bt} f(t)\} = F(s-b), \quad F(s) = \ell\{f(t)\} \Rightarrow \ell\{\cos 7t\} = \frac{s}{s^2+49} \Rightarrow \ell\{e^{3t} \cos 7t\} = \frac{s-3}{(s-3)^2+49}$$

$$\ell\{\cos t\} = \frac{s}{s^2+1} \Rightarrow \ell\{e^{3t} \cos t\} = \frac{s-3}{(s-3)^2+1} \Rightarrow \ell\{e^{3t} \cos 3t \cos 4t\} = \frac{1}{2} \left[\frac{s-3}{(s-3)^2+49} + \frac{s-3}{(s-3)^2+1} \right]$$

$$\frac{1}{(s-1)^3(s^3+1)} = \frac{As^2+Bs+C}{s^3-3s^2+3s-1} + \frac{Ds^2+Es+F}{s^3+1} \quad \text{ب) ابتدا کسر را تجزیه می کنیم.}$$

$$\Rightarrow \frac{(A+D)s^5 + (B+E-3D)s^4 + (C+3D-3E+F)s^3 + (A-D+3E-3F)s^2 + (B-E+3F)s + (C-F)}{(s-1)^3(s^3+1)}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+D=0 \\ B+E-3D=0 \\ C+3D-3E+F=0 \\ A-D+3E-3F=0 \\ B-E+3F=0 \\ C=F=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=-D \\ B-2E+C+F=0 \\ A+C+2D-2F=0 \\ A+B-D+2E=0 \\ 2B-3D+3F=0 \\ C=F+1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F-D=1 \\ 2B+3(F-D)=0 \Rightarrow B=-\frac{3}{2} \\ 2A+2E=\frac{3}{2} \Rightarrow A+E=\frac{3}{4} \\ -2E+2F=\frac{1}{2} \Rightarrow F-E=\frac{1}{4} \\ E-3D=\frac{3}{2} \Rightarrow E+3A=\frac{3}{2} \\ A+C=2 \end{cases}$$

$$A=\frac{3}{8}, \quad B=-\frac{3}{2}, \quad C=\frac{13}{8}, \quad D=-\frac{3}{8}, \quad E=\frac{3}{8}, \quad F=\frac{5}{8} \quad \text{از حل دستگاه فوق به دست می آید:}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{(s-1)^3(s^3+1)} = \frac{1}{8} \left[\frac{3s^2-12s+13}{(s-1)^3} + \frac{-3s^2+3s+5}{s^3+1} \right] \quad \text{و می توان عبارت روبرو را به فرم زیر نوشت.}$$

$$\frac{1}{8} \left[\frac{3(s-1)^2-6(s-1)+4}{(s-1)^3} + \frac{-3(s^2-s+1)}{(s+1)(s^2-s+1)} \right] + \frac{1}{s^3+1} = \frac{1}{8} \left[\frac{3}{(s-1)} - \frac{6}{(s-1)^2} + \frac{4}{(s-1)^3} - \frac{3}{s+1} \right] + \frac{1}{s^3+1}$$

$$\ell\left\{\frac{1}{s-1}\right\} = e^t, \quad \ell\left\{\frac{1}{(s-1)^2}\right\} = te^t, \quad \ell\left\{\frac{1}{(s-1)^3}\right\} = \frac{t^2}{2}e^t, \quad \ell\left\{\frac{1}{s+1}\right\} = e^{-t}$$

برای تعیین لاپلاس $\frac{1}{s^3+1}$ یکبار دیگر باید از تجزیه کسر ها استفاده کرد اما در اینجا تنها جواب آخر آن نوشته می شود.

$$\ell\left\{\frac{1}{s^3+1}\right\} = \frac{e^{\frac{t}{2}}}{3} \left[\sqrt{3} \sin \frac{\sqrt{3}}{2} t - \cos \frac{\sqrt{3}}{2} t + e^{-\frac{3t}{2}} \right]$$

$$\Rightarrow \ell\left\{\frac{1}{(s-1)^3(s^3+1)}\right\} = \frac{1}{8} [3e^t - 6te^t + 2t^2e^t - 3e^{-t}] + \frac{e^{\frac{t}{2}}}{3} \left[\sqrt{3} \sin \frac{\sqrt{3}}{2} t - \cos \frac{\sqrt{3}}{2} t + e^{-\frac{3t}{2}} \right]$$

توجه: راه حل دیگر این مساله استفاده از کانولوشن می باشد اما راه حل فوق آسان تر است زیرا در کانولوشن دو بار باید انتگرال گرفت که آن انتگرال ها بسیار مشکل تر از حل دستگاه 6 مجهولی می باشد.

$$J'_0(x) = -J_1(x) \quad \text{نشان دهید} \quad J_\nu(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(n+\nu+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+\nu} \quad \text{4-الف) اگر}$$

$$\ell^{-1}\left[\frac{1}{(s^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}\right] = \frac{J_1(at)}{a} \quad \text{ب) اگر} \quad \ell[J_0(at)] = \frac{1}{\sqrt{s^2+a^2}} \quad \text{نشان دهید:}$$

$$J_\nu(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(n+\nu+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+\nu} \Rightarrow J_0(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(n+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n!)^2} \frac{x^{2n}}{2^{2n}} \quad \text{پاسخ: الف)}$$

$$J'_0 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(n+1)} \frac{x^{2n-1}}{2^{2n-1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)! \Gamma(n+2)} \frac{x^{2(n+1)-1}}{2^{2(n+1)-1}} = - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)! \Gamma(n+2)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+1} = - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(n+2)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+1}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(n+2)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+1} = J_1(x) \Rightarrow J'_0(x) = -J_1(x)$$

$$J'_0(at) = -aJ_1(at), \quad \ell\{f'(t)\} = sF(s) - f(0)$$

ب) با استفاده از قسمت الف داریم:

$$\Rightarrow \ell\{J'_0(at)\} = s\ell\{J_0(at)\} + J(0) = \frac{s}{\sqrt{s^2+a^2}}, \quad \ell\{-tf(t)\} = F'(s), \quad F(s) = \frac{s}{\sqrt{s^2+a^2}}$$

$$\Rightarrow F'(s) = \frac{a^2}{(s^2+a^2)^{\frac{3}{2}}} \Rightarrow \ell^{-1}\left\{\frac{a^2}{(s^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}\right\} = -tJ'_0(at) \Rightarrow \ell^{-1}\left\{\frac{1}{(s^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}\right\} = -\frac{t}{a^2} J'_0(at)$$

$$J'_0(at) = -aJ_1(at) \Rightarrow \ell^{-1}\left[\frac{1}{(s^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}\right] = \frac{J_1(at)}{a}$$

5- معادله روبرو را حل کنید: $t \frac{d^2 y}{dt^2} + (1-2t) \frac{dy}{dt} - 2y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$

پاسخ: از معادله فوق لاپلاس می گیریم.

$$\ell\{y'\} = sY(s) - y(0) , \ell\{y''\} = s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) \Rightarrow \ell\{y''\} = -(s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0)) = -(s^2 Y(s) - s - 2)$$

$$\Rightarrow \ell\{ty''\} = -(s^2 Y'(s) + 2sY(s) - 1) , \ell\{ty'\} = -(sY(s) - y(0)) = -(sY(s) - 1) = -(sY(s) + Y(s))$$

$$\Rightarrow \ell\left\{t \frac{d^2 y}{dt^2} + (1-2t) \frac{dy}{dt} - 2y\right\} = -s^2 Y'(s) - 2sY(s) + 1 + sY(s) - 1 + 2sY'(s) + 2Y(s) - 2Y(s) = 0$$

$$\Rightarrow (-s^2 + 2s)Y'(s) - sY(s) = 0 \Rightarrow (2-s)Y'(s) - Y(s) = 0 \Rightarrow Y'(s) = \frac{Y(s)}{2-s} \Rightarrow \frac{dY(s)}{ds} = \frac{Y(s)}{2-s} \Rightarrow \frac{dY(s)}{Y(s)} = \frac{ds}{2-s}$$

$$\Rightarrow \ln Y(s) = -\ln(2-s) \Rightarrow Y(s) = \frac{c}{2-s} \Rightarrow y(t) = \ell^{-1}\left\{\frac{c}{2-s}\right\} = -ce^{2t}$$

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x - 2y \\ \frac{dy}{dt} = y - 2x \end{cases}$$

6- دستگاه روبرو را حل کنید. $x(0) = 8$, $y(0) = 3$

پاسخ: از طرفین دستگاه فوق لاپلاس می گیریم.

$$\ell\left\{\frac{dx}{dt}\right\} = sX(s) - x(0) , \ell\left\{\frac{dy}{dt}\right\} = sY(s) - y(0)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} sX(s) - 8 = 2X(s) - 3Y(s) \\ sY(s) - 3 = Y(s) - 2X(s) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (s-2)X(s) + 3Y(s) = 8 \\ 2X(s) + (s-1)Y(s) = 3 \end{cases} \quad \begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

$$\Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} c & b \\ c' & b' \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix}} , y = \frac{\begin{vmatrix} a & c \\ a' & c' \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix}} , \Rightarrow X(s) = \frac{\begin{vmatrix} 8 & 3 \\ 3 & s-1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} s-2 & 3 \\ 2 & s-1 \end{vmatrix}} = \frac{8s-8-9}{s^2-3s+2-6} = \frac{8s-17}{s^2-3s-4}$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{\begin{vmatrix} s-2 & 8 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} s-2 & 3 \\ 2 & s-1 \end{vmatrix}} = \frac{3s-6-16}{s^2-3s+2-6} = \frac{3s-22}{s^2-3s-4} , s^2-3s-4 = (s+1)(s-4)$$

$$\Rightarrow X(s) = \frac{5}{s+1} + \frac{3}{s-4} \Rightarrow x(t) = 5e^{-t} + 3e^{4t} \Rightarrow Y(s) = \frac{5}{s+1} - \frac{2}{s-4} \Rightarrow y(t) = 5e^{-t} - 2e^{4t}$$

((36))

امتحان پایان ترم

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دی ماه 1382

1- در معادله دیفرانسیل $x(x-1)^3 y'' + (2x-2)y' + x(x+1)y = 0$ فقط نقاط معمولی، منفرد منظم و منفرد نامنظم را

مشخص کنید.

پاسخ: می دانیم در معادله $f_1(x)y'' + f_2(x)y' + f_3(x)y = 0$ نقطه $x=a$ یک نقطه معمولی است هرگاه $f_1(a) \neq 0$ باشد.

پس: $x \neq 0, 1 \Rightarrow x(x-1)^3 \neq 0$ نقاط معمولی می باشند. و نقاط $x=0, 1$ نقاط منفرد می باشند. اکنون به بررسی توابع زیر

می پردازیم. مشخص است که توابع $x \times \frac{2x-2}{x(x-1)^3}$ و $x^2 \times \frac{x(x+1)}{x(x-1)^3}$ در نقاط $x=0$ تعریف شده اند پس منفرد منظم هستند ولی

تابع $(x-1) \times \frac{2x-2}{x(x-1)^3}$ در نقطه $x=1$ تعریف نشده است پس منفرد نامنظم است.

2- اگر $y_1 = x - \frac{x^3}{2^2} + \frac{x^5}{2^4(2!)^2} - \frac{x^7}{2^6(3!)^2} + \dots$ یک جواب معادله $x^2 y'' - xy' + (x^2 + 1)y = 0$ باشد، جواب دوم

آنرا بیابید.

پاسخ: می توان تشخیص داد که نقطه $x=0$ یک نقطه منفرد منظم برای معادله فوق است. معادله شاخصی را تشکیل می دهیم:

$$a_0 = \lim_{x \rightarrow 0} x \times \left(-\frac{1}{x}\right) = -1, \quad b_0 = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \times \frac{x^2+1}{x^2} = 1 \Rightarrow \text{معادله شاخصی: } r(r-1) + a_0 r + b_0 = 0 \rightarrow r(r-1) - r + 1 = 0$$

معادله شاخصی دارای ریشه مضاعف $r=0$ است. پس فرم دوم جواب به صورت روبرو می باشد:

$$y_2 = y_1 \ln x + x^0 \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$$

$$y_2' = y_1' \ln x + \frac{y_1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} n C_n x^{n-1}, \quad y_2'' = y_1'' \ln x + \frac{2}{x} y_1' - \frac{y_1}{x^2} + \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) C_n x^{n-2}$$

با جایگذاری مقادیر روبرو داریم:

$$x^2 y_2' - x y_2'' + (x^2 + 1) y_2 = 0 \Rightarrow x^2 y_1' \ln x + 2x y_1' - y_1 + x^2 \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) C_n x^{n-2} - x y_1' \ln x - y_1 - x \sum_{n=1}^{\infty} n C_n x^{n-1} + (x^2 + 1) y_1 \ln x + (x^2 + 1) \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = 0$$

چون y_1 یک ریشه معادله است پس ضرایب $\ln x$ صفر است و با ساده کردن عبارت فوق خواهیم داشت:

((37))

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)C_n x^n - \sum_{n=1}^{\infty} nC_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n+2} + \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n + 2xy'_1 - 2y = 0$$

$$\Rightarrow C_0 x^0 = 0 \rightarrow C_0 = 0, C_1 = 0, C_0 x^2 + C_2 x^2 = 0 \rightarrow C_2 = 0, 4C_3 + C_1 = 1 \rightarrow C_3 = \frac{1}{4}$$

$$9C_4 + C_2 = 0 \rightarrow C_4 = 0, 16C_5 + C_3 = -\frac{1}{8} \rightarrow C_5 = -\frac{3}{2^7}, 25C_6 + C_4 = 0 \rightarrow C_6 = 0, 36C_7 + C_5 = \frac{1}{3 \times 64} \rightarrow C_7 = \frac{5}{6 \times 64}$$

$$y_2 = \ln x \times y_1 + \frac{1}{4}x^3 - \frac{3}{2^7}x^5 + \frac{5}{6 \times 64}x^7 + \dots$$

3- معادله زیر را با استفاده از تغییر متغیر زیر حل کنید.

$$\frac{d}{dx}(x^3 y') - x(x+1)y = 0 \quad y = x^{-1}u, \quad t = 2x^{\frac{1}{2}}$$

$$t = 2x^{\frac{1}{2}} \Rightarrow x = \frac{t^2}{4} \rightarrow dx = \frac{t}{2}dt, \quad y = x^{-1}u \rightarrow dy = -x^{-2}u dx + x^{-1}du \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -x^{-2}u + x^{-1}\frac{du}{dx}, \quad u = xy \quad \text{پاسخ:}$$

$$\frac{d}{dt} \times \frac{2}{t} \left(-\frac{t^2}{4}u + \frac{t^4}{16} \times \frac{du}{dt} \times \frac{2}{t} \right) - u \left(\frac{t^2}{4} + 1 \right) = 0 \Rightarrow t^2 u'' - (t^2 + 6)u = 0 \quad \text{با جایگذاری بدست می آید:}$$

$$\text{معادله شاخصی: } r(r-1) - 6 = 0 \Rightarrow r = 3 \Rightarrow u_1 = t^3 \sum_{n=0}^{\infty} C_n t^n \Rightarrow u'' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+3)(n+2)C_n t^{n+1}$$

$$\Rightarrow -6C_0 t^3 + 6C_0 t^3 = 0, -6C_1 t^4 + 12C_1 t^4 = 0 \rightarrow C_1 = 0, -6C_2 t^5 + 20C_2 t^5 - C_0 t^5 = 0 \rightarrow C_2 = \frac{C_0}{14}$$

$$24C_3 t^6 - C_1 t^6 = 0 \rightarrow C_3 = 0, 36C_4 t^7 - C_2 t^7 = 0 \rightarrow C_4 = \frac{1}{36 \times 14} C_0 \dots \Rightarrow u = C_0 t^3 \left(1 + \frac{x^2}{14} + \frac{x^4}{14 \times 36} + \dots \right)$$

$$4- \text{با استفاده از تبدیل لاپلاس معادله روبرو را حل کنید.} \quad t \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} - ty = 0, \quad y(0^+) = 1$$

$$\ell\{ty''\} = -(s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0)) = -(s^2 Y(s) + 2sY(s) - 1), \quad \ell\{y'\} = sY(s) - 1, \quad \ell\{ty\} = -Y'(s) \quad \text{پاسخ:}$$

$$\Rightarrow -s^2 Y(s) - 2sY(s) + 1 + 2sY(s) - 2 + Y'(s) = 0 \Rightarrow (1-s^2)Y(s) - 1 = 0 \Rightarrow Y(s) = \frac{1}{1-s^2} \Rightarrow Y(s) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+s}{1-s} \right)$$

$$F(s) = \frac{1}{2} [\ln(1+s) - \ln(1-s)], \quad F'(s) = \frac{1}{1-s^2} \Rightarrow \ell\{Y(s)\} = -\frac{1}{t} \ell\{Y'(s)\} = -\frac{1}{t} \times \frac{1}{2} (e^{-t} - e^t) = y(t)$$

5- معادله روبرو را حل کنید.

$$y'' - 2y' + 3y = \begin{cases} t & 0 < t < \pi \\ \sin t & \pi \leq t \end{cases}$$

پاسخ: ابتدا معادله کمکی را تشکیل می دهیم:

$$r^2 - 2r + 3 = 0 \Rightarrow r = 1 \pm i\sqrt{2} \Rightarrow y_h = e^x [A \cos \sqrt{2}x + B \sin \sqrt{2}x]$$

$$y'' - 2y' + 3y = t \Rightarrow y = At + B \Rightarrow y = \frac{1}{3}t + \frac{2}{9} \quad 0 < t < \pi, \quad y'' - 2y' + 3y = \sin t \Rightarrow y = \frac{1}{4}(\sin t + \cos t)$$

6- الف) تبدیل لاپلاس تابع $\int_0^{\sqrt{t}} e^{-u^2} du$ را بیابید.

ب) لاپلاس وارون $\ell^{-1} \left[\frac{1}{(s-4)^2} \cot^{-1}(s-1) \right]$ را حساب کنید.

پاسخ: الف)

$$h(t) = \int_0^{\sqrt{t}} e^{-u^2} du \Rightarrow h'(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}} e^{-t} \Rightarrow \ell\{h'(t)\} = s\ell\{h(t)\} \Rightarrow \ell\left\{\int_0^{\sqrt{t}} e^{-u^2} du\right\} = \frac{1}{s} \ell\left\{\frac{e^{-t}}{2\sqrt{t}}\right\} = \frac{1}{2s} \sqrt{\frac{\pi}{s+1}}$$

ب)

$$F(s) = \cot^{-1}(s-1) \Rightarrow F'(s) = \frac{-1}{(s-1)^2 + 1} \Rightarrow \ell^{-1}\{F'(s)\} = -e^t \sin t, \quad \ell^{-1}\left\{\frac{1}{(s-4)^2}\right\} = te^{4t}$$

با استفاده از کاتولوشن داریم:

$$\ell^{-1}\left[\frac{1}{(s-4)^2} \cot^{-1}(s-1)\right] = \int_0^t (-e^{\lambda} \sin \lambda)(t-\lambda) e^{4(t-\lambda)} d\lambda$$

$$\int e^{-3\lambda} \sin \lambda d\lambda = \frac{e^{-3\lambda}}{10} (-3 \sin \lambda - \cos \lambda), \quad \int \lambda e^{-3\lambda} \sin \lambda d\lambda = \frac{\lambda e^{-3\lambda} (-3 \sin \lambda - \cos \lambda)}{10} - \frac{e^{-3\lambda} (9 \sin \lambda + 6 \cos \lambda)}{100}$$

$$\Rightarrow \int_0^t (-e^{\lambda} \sin \lambda)(t-\lambda) e^{4(t-\lambda)} d\lambda = te^{4t} \left[\frac{e^{-3\lambda}}{10} (3 \sin \lambda + \cos \lambda) \right]_0^t + e^{4t} \int_0^t \lambda e^{-3\lambda} \sin \lambda d\lambda$$

$$\ell^{-1}\left[\frac{1}{(s-4)^2} \cot^{-1}(s-1)\right] = \frac{te^{4t}}{10} [3 \sin t + \cos t - 1] - \frac{e^{4t}}{10} \left[te^{-3t} (3 \sin t + \cos t) + \frac{e^{-3t}}{10} (9 \sin t + 6 \cos t - 6) \right]$$

7- دستگاه روبرو را حل کنید.

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} + 2x + 6 \int_0^t y(t) dt = -2 \\ \frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} + y = 0 \end{cases} \quad x(0) = -5, \quad y(0) = 6$$

این سوال عیناً در 80/4/11 در سوال 6 تکرار شده است. تنها دو متغیر x, y جای یکدیگر را گرفته اند.

5- معادله روبرو را حل کنید.

$$y'' - 2y' + 3y = \begin{cases} t & 0 < t < \pi \\ \sin t & \pi \leq t \end{cases}$$

پاسخ: ابتدا معادله کمکی را تشکیل می دهیم:

$$r^2 - 2r + 3 = 0 \Rightarrow r = 1 \pm i\sqrt{2} \Rightarrow y_h = e^x [A \cos \sqrt{2}x + B \sin \sqrt{2}x]$$

$$y'' - 2y' + 3y = t \Rightarrow y = At + B \Rightarrow y = \frac{1}{3}t + \frac{2}{9} \quad 0 < t < \pi, \quad y'' - 2y' + 3y = \sin t \Rightarrow y = \frac{1}{4}(\sin t + \cos t)$$

6- الف) تبدیل لاپلاس تابع $\int_0^{\sqrt{t}} e^{-u^2} du$ را بیابید.

ب) لاپلاس وارون $\ell^{-1} \left[\frac{1}{(s-4)^2} \cot^{-1}(s-1) \right]$ را حساب کنید.

پاسخ: الف)

$$H(t) = \int_0^{\sqrt{t}} e^{-u^2} du \Rightarrow h'(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}} e^{-t} \Rightarrow \ell\{h'(t)\} = s\ell\{h(t)\} \Rightarrow \ell\left\{\int_0^{\sqrt{t}} e^{-u^2} du\right\} = \frac{1}{s} \ell\left\{\frac{e^{-t}}{2\sqrt{t}}\right\} = \frac{1}{2s} \sqrt{\frac{\pi}{s+1}}$$

ب)

$$F(s) = \cot^{-1}(s-1) \Rightarrow F'(s) = \frac{-1}{(s-1)^2 + 1} \Rightarrow \ell^{-1}\{F'(s)\} = -e^t \sin t, \quad \ell^{-1}\left\{\frac{1}{(s-4)^2}\right\} = te^{4t}$$

$$\ell^{-1}\left[\frac{1}{(s-4)^2} \cot^{-1}(s-1)\right] = \int_0^t (-e^{\lambda} \sin \lambda)(t-\lambda) e^{4(t-\lambda)} d\lambda$$

با استفاده از کاتولوشن داریم:

$$\int e^{-3\lambda} \sin \lambda d\lambda = \frac{e^{-3\lambda}}{10} (-3 \sin \lambda - \cos \lambda), \quad \int \lambda e^{-3\lambda} \sin \lambda d\lambda = \frac{\lambda e^{-3\lambda} (-3 \sin \lambda - \cos \lambda)}{10} - \frac{e^{-3\lambda} (9 \sin \lambda + 6 \cos \lambda)}{100}$$

$$\Rightarrow \int_0^t (-e^{\lambda} \sin \lambda)(t-\lambda) e^{4(t-\lambda)} d\lambda = te^{4t} \left[\frac{e^{-3\lambda}}{10} (3 \sin \lambda + \cos \lambda) \right]_0^t + e^{4t} \int_0^t \lambda e^{-3\lambda} \sin \lambda d\lambda$$

$$\ell^{-1}\left[\frac{1}{(s-4)^2} \cot^{-1}(s-1)\right] = \frac{te^{4t}}{10} [3 \sin t + \cos t - 1] - \frac{e^{4t}}{10} \left[te^{-3t} (3 \sin t + \cos t) + \frac{e^{-3t}}{10} (9 \sin t + 6 \cos t - 6) \right]$$

7- دستگاه روبرو را حل کنید.

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} + 2x + 6 \int_0^t y(t) dt = -2 \\ \frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} + y = 0 \end{cases} \quad x(0) = -5, \quad y(0) = 6$$

این سوال عیناً در 80/4/11 در سوال 6 تکرار شده است. تنها دو متغیر x, y جای یکدیگر را گرفته اند.

نمونه سوالات پایان ترم

معادلات دیفرانسیل



| | | |
|---|---|--|
| <p>نام خانوادگی :</p> <p>شماره دانشجویی :</p> <p>استاد درس : گروه ریاضی</p> | <p>نام : به نام خدا</p> <p>سوالات پایان ترم درس معادلات دیفرانسیل</p> <p>دانشگاه امیرکبیر</p> <p>دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر</p> | <p>تاریخ : چهارشنبه ۸۸/۱۰/۲۳</p> <p>مدت امتحان : ۱۲۰ دقیقه</p> <p>ساعت : ۹ صبح</p> <p>امتحان پایان ترم</p> |
|---|---|--|

۱- به کمک سری توانی حول $x_0 = 0$ معادله زیر را حل کنید (۳۰ نمره).

$$x^2 y'' - 3xy' + 4y = 0$$

۲- با استفاده از تغییر متغیر $y = x^{1/2} u(t)$ که در آن $t = \frac{4}{5} \sqrt{3} x^{5/4}$ می باشد، معادله $y'' + 3\sqrt{x}y = 0$ را حل کنید (۲۰ نمره).

۳- مطلوب است :

الف : $L \left\{ e^{-t} \int_0^t \frac{1 - \cos x}{x^2} dx \right\}$ (۱۰ نمره)

ب : $L^{-1} \left\{ \frac{1}{\sqrt{s^2 - 4s + 20}} \right\}$ (۱۰ نمره)

۴- الف : نشان دهید که $f * g = g * f$ (۵ نمره).

ب : با استفاده از (الف) معادله دیفرانسیل - انتگرالی زیر را حل کنید (۱۰ نمره).

$$y(t) = e^{-t} + \int_0^t \lambda^2 y''(t - \lambda) d\lambda$$

۵- با استفاده از تبدیل لاپلاس معادله زیر را حل کنید (۱۰ نمره).

$$ty'' + (1 - 2t)y' - 2y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 2$$

۶- در دستگاه معادلات دیفرانسیل زیر فقط $y(t)$ را بیابید (۱۵ نمره).

$$\begin{cases} y' + x' = t, \\ y'' - x = e^{-t} \end{cases} \quad y(0) = 3, \quad y'(0) = -2, \quad x(0) = 0$$

موفق باشید

به کمک معادلات دیفرانسیل می توانید رفتار سیستم های پیرامون خود را بهتر تحلیل کنید

بارم ۱۱۰ نمره از کل ۱۸۰

۱۸/۱۰/۲۳

پایان

$$x^r y'' - rx y' + ry = 0 \rightarrow y'' - \frac{r}{x} y' + \frac{r}{x^2} y = 0$$

جواب ①:

$$x \cdot \frac{-r}{x} = -r, \quad x^r \cdot \frac{r}{x^2} = r \rightarrow x=0 \text{ نقطه غیر عادی منظم}$$

$$r(r-1) - r^2 + r = 0 \Rightarrow (r-2)^2 = 0 \rightarrow r_1 = r_2 = 2 \text{ ریشه مضاعف}$$

$$y_1 = x^2 \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, \quad y_2 = y_1 \ln x + x^2 \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$$

$$y = \beta_1 y_1 + \beta_2 y_2 \text{ شکل}$$

$$y_1 = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+2} \sim y_1' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2) c_n x^{n+1} \sim y_1'' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) c_n x^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) c_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} r c_n (n+2) x^{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} r c_n x^{n+2} = 0$$

$$n=0: (2)(1) c_0 - r c_0 + r c_0 = 0 \rightarrow c_0 x^0 = 0 \Rightarrow c_0 \text{ دلخواه}$$

$$n > 1: c_n = 0 \Rightarrow y_1 = c_0 x^2$$

$$y_2 = c_0 x^2 \ln x + x^2 \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$$

در برای حل دوم داریم:

$$y_2' = r c_0 x \ln x + c_0 x + \sum_{n=1}^{\infty} (n+2) a_n x^{n+1}$$

$$y_2'' = r c_0 \ln x + r c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (n+2)(n+1) a_n x^n$$

$$r c_0 x \ln x + r c_0 x + \sum_{n=1}^{\infty} (n+2)(n+1) a_n x^{n+1} - r c_0 x^2 \ln x -$$

جایگزینی در معادله اصلی:

$$r c_0 x - \sum_{n=1}^{\infty} r a_n (n+2) x^{n+1} + r c_0 x^2 \ln x + \sum_{n=1}^{\infty} r a_n x^{n+2} = 0$$

$$c_0 x^2 \ln x (r - r + r) = 0 \rightarrow c_0 \text{ دلخواه}$$

$$n=1: r a_1 - r a_1 + r a_1 = 0 \rightarrow a_1 = 0$$

$$n=2: a_2 = 0$$

شماره ای عشق

معادلات دیفرانسیل

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

برای تمام مقادیر a_n ، $n \geq 1$ داریم: $a_n = 0$ پس $y = C_2 x^2 \ln x$

پس جواب عمومی به شکل $y = C_1 x^2 + C_2 x^2 \ln x$ است. ✓

* یادآوری ... حتماً به خاطر می آورید که معادله $x^2 y'' - 3x y' + 4y = 0$ یک معادله ادری (لینیه) محسوب می شود پس

می توانیم با قرار دادن $y = x^r$ به دست آوریم: $y = x^r \rightarrow y' = r x^{r-1} \rightarrow y'' = r(r-1) x^{r-2}$

جایگذاری در معادله اصلی: $x^2 r(r-1) x^{r-2} - 3x r x^{r-1} + 4x^r = 0$

$$x^r (r(r-1) - 3r + 4) = 0 \Rightarrow r_1 = r_2 = 2 \quad \text{ریشه مضاعف}$$

$y_1 = x^2$ $y_2 = x^2 \ln x$ \rightarrow جواب عمومی $y = C_1 x^2 + C_2 x^2 \ln x$

جواب (۲):

$$y = x^{\frac{1}{\sqrt{3}}} u \rightarrow y' = \frac{1}{\sqrt{3}} x^{-\frac{1}{\sqrt{3}}} u + x^{\frac{1}{\sqrt{3}}} u' \quad \text{I} \rightarrow y'' = \frac{1}{\sqrt{3}} x^{-\frac{3}{\sqrt{3}}} u + x^{-\frac{1}{\sqrt{3}}} u' + x^{\frac{1}{\sqrt{3}}} u'' \quad \text{II}$$

$$* t = \frac{\sqrt{3}}{3} x^{3/2} *$$

$$\frac{dt}{dx} = \sqrt{3} x^{1/2}$$

$$u' = \frac{du}{dx} = \frac{du}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \sqrt{3} x^{1/2} \frac{du}{dt}$$

$$u'' = \frac{du'}{dx} = \frac{d(\sqrt{3} x^{1/2} \frac{du}{dt})}{dx} = \frac{\sqrt{3}}{2} x^{-1/2} \frac{du}{dt} + \sqrt{3} x^{1/2} \frac{d^2 u}{dt^2}$$

$$\frac{d^2 u}{dt^2} = \frac{d^2 u}{dt^2} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{d^2 u}{dt^2} \cdot \sqrt{3} x^{1/2}$$

حال مقادیر u ، u' و u'' در I، II، III و پس I، II در معادله اصلی قرار می دهیم. خواهیم داشت:

$$\frac{1}{\sqrt{3}} x^{-3/2} u + x^{-1/2} \left(\sqrt{3} x^{1/2} \frac{du}{dt} \right) + x^{1/2} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} x^{-1/2} \frac{du}{dt} + \sqrt{3} x^{1/2} \frac{d^2 u}{dt^2} \cdot \sqrt{3} x^{1/2} \right) + \frac{3}{2} x^{1/2} \left(x^{1/2} u \right) = 0$$

حال با توجه به رابطه (*) در معادله بالا به جای x ، t قرار می دهیم:

نویسنده: علیرضا

دانشگاه ریاضی و علوم کامپیوتر

معادلات دیفرانسیل

$$t = \frac{r}{\omega} \sqrt{\frac{r}{r}} x$$

$$(1) x^{1/4} = \left(\frac{\delta}{r} \frac{\sqrt{r}}{r} t \right)^{1/5} \quad (2) x^{-1/4} = \left(\frac{\delta}{r} \frac{\sqrt{r}}{r} t \right)^{-1/5} \quad (3) x = \left(\frac{\delta}{r} \frac{\sqrt{r}}{r} t \right)^{5/8}$$

$$\frac{-1}{r} \left(\frac{\delta}{r} \frac{\sqrt{r}}{r} t \right)^{-1/5} u + \sqrt{r} \left(\frac{\delta}{r} \frac{\sqrt{r}}{r} t \right)^{1/5} \frac{du}{dt} + \frac{\sqrt{r}}{r} \left(\frac{\delta}{r} \frac{\sqrt{r}}{r} t \right)^{-1/5} \frac{du}{dt} + r \left(\frac{\delta}{r} \frac{\sqrt{r}}{r} t \right)^{5/8} \frac{du}{dt}$$

$$+ r \left(\frac{\delta}{r} \frac{\sqrt{r}}{r} t \right)^{1/5} u = 0$$

معادله تبدیل به معادله میل می شود جواب عمومی آن به صورت زیر است:

$$y = x^{1/4} \left(A J_{1/5} \left(\frac{r\sqrt{a}}{\omega} (x^{5/4}) \right) + B Y_{1/5} \left(\frac{r\sqrt{a}}{\omega} (x^{5/4}) \right) \right)$$

$$y = x^{1/4} u(t), \quad t = \frac{r\sqrt{a}}{\omega} (x^{5/4}) \quad \text{با استفاده از تغییر متغیر} \quad y'' + a x^b y = 0$$

حالت تبدیل به معادله میل می باشد جواب عمومی آن به صورت زیر است:

$$y = x^{1/4} \left[A J_{1/5} \left(\frac{r\sqrt{a}}{\omega} (x^{5/4}) \right) + B Y_{1/5} \left(\frac{r\sqrt{a}}{\omega} (x^{5/4}) \right) \right]$$

جواب (3): الف)

$$L \left[e^{-t} \int_0^t \frac{1 - \cos n}{x^r} dx \right] = F(p) = F_1(p+1)$$

$$F_1(p) = L \left[\int_0^t \frac{1 - \cos n}{x^r} dx \right] = \frac{1}{p} F_r(p) \quad F_r(p) = L \left[\frac{1 - \cos n}{x^r} \right]$$

$$L \left(\frac{1 - \cos n}{x} \right) = \int_p^\infty \left(\frac{1}{u} - \frac{u}{u^2+1} \right) du = \ln \frac{\sqrt{p^2+1}}{p} \quad \text{پس: } L(1 - \cos n) = \frac{1}{p} - \frac{p}{p^2+1}$$

حال با ریدر اهری حاصل می شود پس به این معادله:

$$L \left[\frac{1 - \cos n}{x^r} \right] = \int_p^\infty \ln \frac{\sqrt{u^2+1}}{u} du = p \ln \frac{p}{\sqrt{p^2+1}} + \frac{\pi}{2} - \text{Arctan } p$$

$$F_r(p) = p \ln \frac{p}{\sqrt{p^2+1}} + \frac{\pi}{2} - \text{Arctan } p \rightarrow F_1(p) = \ln \frac{p}{\sqrt{p^2+1}} + \frac{\pi}{2p} - \frac{\text{Arctan } p}{p}$$

$$\Rightarrow F(p) = \ln \frac{p+1}{\sqrt{(p+1)^2+1}} + \frac{\pi}{2(p+1)} - \frac{\text{Arctan}(p+1)}{p+1}$$

شوازی صفتی

دانشگاه ریاضی و علوم کامپیوتر

معادلات دیفرانسیل

(-)

* توجه: اگر معادله مرتبه ضریبی را بنویسیم، یعنی $xy'' + y' + xy = 0$ ، آن گاه با استفاده از تبدیل لاپلاس داریم:

$$L[xy''] + L[y'] + L[xy] = 0 \quad ; \quad L[y'] = p' L(y) - p y(0) - y'(0)$$

$$(*) : L[xy''] = (-L[y'])' = \frac{d}{dp} (-L[y']) = \frac{d}{dp} [-(p' L(y) - p y(0) - y'(0))] =$$

$$-2p L(y) - p' L'(y) + y(0)$$

$$(**) : L(y') = p L(y) - y(0) \quad (***) : L[xy] = -\frac{d}{dp} L(y) = -L'(y)$$

$$\Rightarrow L[xy''] + L[y'] + L[xy] = 0 \Rightarrow -2p L(y) - p' L'(y) + y(0) + p L(y) - y(0) - L'(y) =$$

$$\Rightarrow (-1 - p') L'(y) = p L(y) \Rightarrow \frac{L'(y)}{L(y)} = \frac{-p}{1+p^2} \Rightarrow \ln L(y) = \frac{-1}{2} \ln(1+p^2)$$

$$\Rightarrow L(y) = \frac{1}{\sqrt{p^2+1}}$$

$$L[J_0(ax)] = \frac{1}{\sqrt{p^2+a^2}}$$

پس به کمک طی داریم:

$$L^{-1}\left[\frac{1}{\sqrt{p^2-4p+2}}\right] = L^{-1}\left[\frac{1}{\sqrt{(p-2)^2+1}}\right] =$$

حال به حل معادله می پردازیم:

$$= e^{rt} J_0(ft) \quad \checkmark$$

جواب (۴): الف)

ما داریم کانولوشن (تولیدین) در تابع $f(t)$ و $g(t)$ به نام $(f * g)(t)$ نشان داده می شود، عبارت است از:

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(\lambda) g(t-\lambda) d\lambda$$

حال برای اثبات خاصیت جابجایی کانولوشن کافی است که در همین:

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(\lambda) g(t-\lambda) d\lambda = - \int_t^0 f(t-\lambda) g(\lambda) d\lambda$$

پس:

شماره ای عشق

معادلات دیفرانسیل

دانشگاه ریاضی و علوم کامپیوتر

$$= \int_0^t g(u) f(t-u) du \quad \text{و } v = t-u \quad \text{و } dv = -du$$

$$y(t) = e^{-t} + \int_0^t y''(u) (t-u)^2 du$$

(ب) ثابت الف داریم:

$$L[y] = L[e^{-t}] + L\left[\int_0^t y''(u) (t-u)^2 du\right]$$

حال از فرض (ا) پلاس می گیریم:

$$L[y] = \frac{1}{p+1} + L[y''] \frac{2!}{p^3} \rightarrow L[y] = \frac{1}{p+1} + \frac{2}{p^3} [p^2 L[y] - p y(0) - y'(0)]$$

$$\rightarrow L[y] = \frac{1}{p+1} + \frac{2}{p} L[y] - \frac{2}{p^2} y(0) - \frac{2}{p^3} y'(0)$$

$$\frac{p-2}{p} L[y] = \frac{1}{p+1} - \frac{2 y(0)}{p^2} - \frac{2 y'(0)}{p^3}$$

$$\Rightarrow L[y] = \frac{p}{(p+1)(p-2)} - \frac{2 y(0)}{p(p-2)} - \frac{2 y'(0)}{p^2(p-2)}$$

$$L[y] = \frac{1/3}{p+1} + \frac{2/3}{p-2} + \frac{y(0)}{p} - \frac{y(0)}{p-2} + \frac{(1/2 p + 1) y'(0)}{p^2} - \frac{1/2 y'(0)}{p-2}$$

$$\rightarrow y(t) = \frac{1}{3} e^{-t} + \frac{2}{3} e^{2t} + y(0) - y(0) e^{2t} + \frac{1}{2} y'(0) + t y'(0) - \frac{1}{2} y'(0) e^{2t}$$

جواب (۵):

$$L[t y''] + L[(1-2t) y'] - L[2y] = 0$$

با توجه به تبدیلی لاپلاس داریم:

$$\rightarrow L[t y''] + L[y'] - 2L[t y'] - 2L[y] = 0$$

$$L[t y''] = -\frac{d}{dp} L[y''] = -\frac{d}{dp} (p^2 L[y] - p y(0) - y'(0)) = -2p L[y] - p^2 L'[y]$$

$$+ y(0) \quad (*) \quad L[y'] = p L[y] - y(0) \quad (**)$$

$$L[t y'] = -\frac{d}{dp} L[y'] = -\frac{d}{dp} (p L[y] - y(0)) = -L[y] - p L'[y] \quad (***)$$

$$\Rightarrow L[t y''] + L[y'] - 2L[t y'] - 2L[y] = 0 \Rightarrow$$

$$L'[y] = Y' \quad L[y] = Y \quad \text{برای سادگی می نویسیم:}$$

شماره ای عشقی

دانشکده راضی و علوم کامپیوتر

معادلات دیفرانسیل

۲۷

$$pY - p^2 Y' + 1 + \dots + 1 + p^2 - 1 = \dots - p^2$$

$$\rightarrow \frac{Y'}{Y} = \frac{1}{r-p} \rightarrow \ln Y = \ln \frac{1}{r-p} \rightarrow Y = \frac{1}{s-r} \rightarrow y(t) = -e^{rt} \checkmark$$

جواب 7:

$$\begin{cases} L[y'] + L[x'] = L[1] \\ L[y''] \cdot L[x] = L[e^t] \end{cases} \rightarrow \begin{cases} pL[y] - y(0) + pL[x] - x(0) = \frac{1}{p} \\ p^2 L[y] - py'(0) - y(0) - L[x] = \frac{1}{p+1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} pL[y] + pL[x] = r + \frac{1}{p} \\ xp \cdot p^2 L[y] - pL[x] = rp^2 + \frac{p}{p+1} + rp \end{cases}$$

دستگاه را در دو خط حل می کنیم:

$$(1+p^2)L[y] = rp^2 + rp + \frac{p}{p+1} + \frac{1}{p} + r \xrightarrow{\div p}$$

$$(1+p^2)L[y] = rp + r + \frac{1}{p+1} + \frac{1}{p^2} + \frac{r}{p} \Rightarrow$$

$$L[y] = \frac{rp}{1+p^2} + \frac{r}{1+p^2} + \frac{1}{(p+1)(p^2+1)} + \frac{1}{p^2(p^2+1)} + \frac{r}{p(p^2+1)} \Rightarrow$$

$$y(t) = r \cos t + r \sin t + \frac{1}{r} e^t - \frac{1}{r} \cos t + \frac{1}{r} \sin t + t - \sin t + rt - r \cos t \checkmark$$

در پاسخ داریم:

$$\frac{r}{p(1+p^2)} = \frac{A}{p} + \frac{Bp+C}{1+p^2} \rightarrow A + Ap^2 + Bp^2 + Cp = r \rightarrow A = r, C = 0, B = -r$$

$$L^{-1} \left[\frac{r}{p(1+p^2)} \right] = L^{-1} \left[\frac{r}{p} - \frac{rp}{1+p^2} \right] = rt - \cos t$$

$$\frac{1}{p^2(p^2+1)} = \frac{1}{p^2} + \frac{-1}{1+p^2} \Rightarrow L^{-1} \left[\frac{1}{p^2(p^2+1)} \right] = t - \sin t$$

$$\frac{1}{(p+1)(1+p^2)} = \frac{A}{1+p} + \frac{Bp+C}{1+p^2} \rightarrow A + Ap^2 + Bp^2 + Bp + Cp + C = 1 \rightarrow A = \frac{1}{r}, B = -\frac{1}{r}, C = \frac{1}{r}$$

$$\rightarrow L^{-1} \left[\frac{1}{(p+1)(1+p^2)} \right] = \frac{1}{r} e^t - \frac{1}{r} \cos t + \frac{1}{r} \sin t$$

شماره ای عشق

انستیتو ریاضی و علوم کامپیوتر

معادلات دیفرانسیل

| | | |
|---|---|---|
| نام : نام خانوادگی : شماره دانشجویی : استاد درس : گروه ریاضی | به نام خدا سوالات پایان ترم درس معادلات دیفرانسیل دانشگاه امیر کبیر دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر | تاریخ : پنج شنبه ۸۸/۵/۱ مدت امتحان : ۱۲۰ دقیقه ساعت : ۹ صبح امتحان پایان ترم |
|---|---|---|

۱- سه جمله اول بسط تابع زیر را بر حسب تابع لژاندر بیان کنید (۱۰ نمره).

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -1 \leq x < 0 \\ x, & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

۲- نقاط تحلیلی (عادی) و منفرد منظم (غیرعادی منظم) معادله زیر را تعیین کنید. سپس به کمک سری توانی یک جواب آن معادله را به دست آورده و در آخر فقط فرم جواب دوم و عمومی آن را بنویسید (۳۰ نمره).

$$x^2 y'' + 3xy' + (1+x)y = 0$$

۳- الف : با استفاده از تغییر متغیر $y = x^{-1/2} z(x)$ نشان دهید که جواب عمومی معادله دیفرانسیل زیر به صورت $y = x^{-1/2} (c_1 \cos x + c_2 \sin x)$ است (۱۰ نمره).

$$4x^2 y'' + 4xy' + (4x^2 - 1)y = 0$$

ب : آیا جواب فوق به فرم دیگری می توان نوشت، در صورت مثبت بودن پاسخ، تساویهایی بنویسید (۵ نمره).

۴- به کمک تبدیل لاپلاس معادله زیر را حل کنید (۲۰ نمره).

$$y'' - y = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < 1 \\ t-1, & t \geq 1 \end{cases}; y(0) = 1, y'(0) = 0$$

۵- مطلوب است :

$$\text{الف : (۱۰ نمره)} \quad L \left\{ t e^{4t} \int_0^t \frac{1 - \cos x}{x} dx \right\}$$

$$\text{ب : (۱۰ نمره)} \quad L^{-1} \left\{ \frac{s}{(s^2 + 1)^2} \ln \frac{s}{s-1} \right\}$$

۶- معادله دیفرانسیل - انتگرالی زیر را حل کنید (۱۵ نمره).

$$y' + \sin t = 1 - \int_0^t y(x) dx; y(0) = 0$$

بارم ۱۱۰ نمره از کل ۱۸۰

موفق باشید

به کمک معادلات دیفرانسیل می توانید رفتار سیستم های پیرامون خود را بهتر تحلیل کنید

۸۸۵۱

جواب ۱:

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n P_n(x)$$

با توجه به اینکه اگر F یک چند جمله‌ای باشد، ضرایب است:

حاصل می‌شود که $P_m(x)$ ضریب c_m در $P_m(x)$ است. از آنجا که $P_m(x)$ از $P_n(x)$ مستقل است:

$$\int_{-1}^1 F(x) P_m(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx \rightsquigarrow \int_{-1}^1 F(x) P_m(x) dx = \frac{2c_m}{c_m+1}$$

$$n=m : c_m = \frac{2m+1}{2} \int_{-1}^1 F(x) P_m(x) dx$$

با توجه به اینکه از فرمول $P_n(x) = \frac{1}{n!} \frac{d^n (x^2-1)^n}{dx^n}$ می‌توانیم: $P_0(x)=1$ و $P_1(x)=x$

$$F(x) = c_0 P_0(x) + c_1 P_1(x) + \dots \quad \text{داریم} \quad \dots, P_3(x) = \frac{1}{4} (5x^3 - 3x), \quad P_4(x) = \frac{1}{8} (35x^4 - 30x^2 + 3)$$

$$c_0 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 F(x) dx = \frac{1}{2} \left[\int_{-1}^0 (-1) dx + \int_0^1 x dx \right] = \frac{1}{2} \left[-1 + \frac{1}{2} \right] = -\frac{1}{4}$$

$$c_1 = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 F(x) \cdot x dx = \frac{3}{2} \left[\int_{-1}^0 (-x) dx + \int_0^1 x^2 dx \right] = \frac{3}{2} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right] = \frac{5}{4}$$

$$c_2 = \frac{5}{2} \int_{-1}^1 F(x) \left(\frac{1}{2} (3x^2 - 1) \right) dx = \frac{5}{4} \int_{-1}^1 x^2 F(x) dx - \frac{5}{4} \int_{-1}^1 F(x) dx = \frac{5}{4} \left[\int_{-1}^0 -x^2 dx + \int_0^1 x^3 dx \right] - \frac{5}{4} \left[\int_{-1}^0 (-1) dx + \int_0^1 x dx \right] = \frac{5}{4} \left[-\frac{1}{3} \right] - \frac{5}{4} \left[-\frac{1}{2} \right] = \frac{5}{24}$$

$$\Rightarrow F(x) = -\frac{1}{4} + \frac{5}{4} x + \frac{5}{24} (3x^2 - 1) + \dots$$

جواب ۲:

$$x^2 y'' + 3x y' + (1+x) y = 0 \rightarrow y'' + \frac{3}{x} y' + \frac{1+x}{x^2} y = 0$$

$$x=0 \text{ یک نقطه غیر عادی تنگ (نقطه) و یک نقطه عادی است.} \Rightarrow \frac{1+x}{x^2} \cdot x^2 = 1+x \quad , \quad \frac{3}{x} \cdot x = 3$$

$$r(r-1) + 3r + 1 = 0 \rightsquigarrow r^2 + 2r + 1 = 0 \rightsquigarrow (r+1)^2 = 0 \rightsquigarrow r = -1$$

شعاعی صاف

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

این جواب به شکل $y = x \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$ در جواب درم برسل $y = y_1 \ln x + x \sum_{n=1}^{\infty} A_n x^n$ جواب عمومی آن برسل است. حال اگر $y = \beta_1 y_1 + \beta_2 y_2$ در نتیجه:

$$y_1' = \sum_{n=0}^{\infty} (n-1) C_n x^{n-2} \quad y_1'' = \sum_{n=0}^{\infty} (n-1)(n-2) C_n x^{n-3}$$

حال برای تحقق کردن C_n ها، مقادیر y_1 و y_1' در معادله اصلی جایگزینی کنیم:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n-1)(n-2) C_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} 3 C_n (n-1) x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = 0$$

ضرب x^0 : $0 + 0 + C_1 + C_0 = 0 \Rightarrow C_1 = -C_0$

ضرب x^1 : $0 + 3C_2 + C_2 + C_1 = 0 \Rightarrow C_2 = -\frac{1}{4} C_1 = \frac{1}{4} C_0$

ضرب x^2 : $2C_3 + 7C_3 + C_2 + C_2 = 0 \Rightarrow C_3 = -\frac{1}{9} C_2$

ضرب x^n : $(n)(n-1)C_{n+1} + 3nC_{n+1} + C_{n+1} + C_n = 0 \Rightarrow C_{n+1} = \frac{-C_n}{n^2 + 2n + 1}$

$y = C_0 x^{-1} + C_1 + C_2 x + C_3 x^2 + \dots \Rightarrow y_1 = C_0 x^{-1} - C_0 + \frac{1}{4} C_0 + \dots$ ✓

جواب (۳) الف):

$$y' = \frac{1}{x} x^{-3/2} z + x^{-1/2} z', \quad y'' = \frac{3}{x} x^{-3/2} z - x^{-1/2} z' + x^{-1/2} z''$$

پس از جایگزینی در معادله داریم:

$$3x^{-1/2} z - 4x^{-1/2} z' + 4x^{1/2} z'' - 2x^{-1/2} z + 4x^{1/2} z' + 4x^{3/2} z - x^{-1/2} z = 0$$

$$4x^{3/2} (z'' + z) \Rightarrow z = C_1 \cos x + C_2 \sin x$$

پس جواب عمومی معادله:

$$y = x^{-1/2} (C_1 \cos x + C_2 \sin x)$$

ب):

پس می دانیم شکل کلی معادله برسل به صورت $y'' + y' + (x^2 - 1/4)y = 0$ است. حال برای معادله

$$x'' + \lambda x + \dots = 0$$

که مثل $\frac{1}{r}$ است. پس نرم دیرجواب به صورت $y = C_1 J_{\frac{1}{r}}(u) + C_2 J_{-\frac{1}{r}}(u)$ است. جواب (۴):

$$\begin{aligned} y'' - y &= (t-1)u(t) \rightarrow L[y''] - L[y] = L[(t-1)u(t)] \rightarrow \\ p^2 L[y] - p y(0) - y'(0) - L[y] &= e^{-p} \frac{1}{p^r} \rightarrow (p^2 - 1) L[y] = \frac{e^{-p}}{p^r} + p \\ \rightarrow L[y] &= \frac{e^{-p}}{p^r(p^2 - 1)} + \frac{p}{p^2 - 1} \rightarrow y = u_1(u) \sinh(u-1) + u_1(u) (u-1) + \cosh u \\ \frac{e^{-p}}{p^r(p^2 - 1)} &= \frac{e^{-p}}{p^2 - 1} - \frac{e^{-p}}{p^r} \rightarrow L^{-1} \left[\frac{e^{-p}}{p^r(p^2 - 1)} \right] = L^{-1} \left[\frac{e^{-p}}{p^2 - 1} + \frac{e^{-p}}{p^r} \right] \\ &= u_1(u) \sinh(u-1) + u_1(u) (u-1) \end{aligned}$$

جواب (۵) الف):

$$F(p) = L \left[t e^{ft} \int_0^t \frac{1 - \cos u}{u} du \right] = -F'_1(p) = -\frac{d}{dp} F_1(p)$$

$$F_1(p) = L \left[e^{ft} \int_0^t \frac{1 - \cos u}{u} du \right] = F_r[p-f]$$

$$F_r(p) = L \left[\int_0^t \frac{1 - \cos u}{u} du \right] = \frac{1}{p} F_r(p)$$

$$F_r(p) = L \left[\frac{1 - \cos u}{u} \right] = \int_p^\infty \left(\frac{1}{u} - \frac{u}{u^2 + 1} \right) du = \ln \frac{\sqrt{p^2 + 1}}{p}$$

$$\rightarrow F_r(p) = \frac{1}{p} \ln \frac{\sqrt{p^2 + 1}}{p} \rightarrow F_1(p) = \frac{1}{p-f} \ln \frac{\sqrt{(p-f)^2 + 1}}{p-f}$$

$$F(p) = \frac{-d}{dp} F_1(p) = \frac{1}{(p-f)^2} \ln \frac{\sqrt{(p-f)^2 + 1}}{p} - \frac{1}{p-f} + \frac{\frac{d}{dp} \sqrt{(p-f)^2 + 1}}{\sqrt{(p-f)^2 + 1}} - \frac{1}{p-f} \checkmark$$

جواب (۶):

$$L^{-1} [F(s) G(s)] = \int_0^t f(u) g(t-u) du$$

شورای عشق

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

معادلات دیفرانسیل

۲۵

$$F(s) = \frac{s}{(s^2+1)^2} ; L\left[\frac{t f(t)}{n}\right] = \int_s F(u) du \rightarrow \frac{f(t)}{n} = L^{-1}\left[\int_s F(u) du\right]$$

$$\rightarrow F(t) = n L^{-1}\left[\int_s^\infty F(u) du\right] \quad f(u) = \frac{u}{(u^2+1)} \quad \int_s^\infty f(u) du = \int_s^\infty \frac{u}{u^2+1} du$$

$$= \left[-\frac{1}{2} \ln(u^2+1)\right]_s^\infty = -\frac{1}{2} \left[\frac{-1}{s^2+1}\right] \Rightarrow F(t) = n L^{-1}\left[\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s^2+1}\right] \rightarrow F(t) = \frac{1}{2} n \cdot \sin t$$

$$G(s) = \ln \frac{s}{s-1} ; L[-x f(x)] = \frac{d}{ds} F(s) \rightarrow -x f(x) = L^{-1}\left[\frac{d}{ds} F(s)\right]$$

$$\rightarrow F(t) = \frac{1}{n} L^{-1}\left[\frac{d}{ds} F(s)\right] \rightarrow \frac{d}{ds} G(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s-1}$$

$$L^{-1}\left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s-1}\right] = 1 - e^t \rightarrow g(t) = \frac{e^t - 1}{t}$$

$$\Rightarrow L^{-1}[F(s) G(s)] = \frac{1}{2} \int_0^t (n \cdot \sin x) \frac{e^{t-x} - 1}{t-x} dx \quad \checkmark$$

جواب ①:

$$L[y'] + L[\sin t] = L(1) - L\left[\int_0^t y(x) dx\right] \rightarrow$$

$$p L[y] - y(0) + \frac{1}{p^2+1} = \frac{1}{p} - \frac{1}{p} L[y] \xrightarrow{x \rightarrow p}$$


$$p^2 L[y] + \frac{p}{p^2+1} = 1 - L[y] \rightarrow (p^2+1) L[y] = 1 - \frac{p}{p^2+1} \rightarrow$$

$$L[y] = \frac{1}{(p^2+1)} - \frac{p}{(p^2+1)^2} \quad , \quad L[\sin t] = \frac{1}{1+p^2}$$

$$L[x f(x)] = -F'(p) \quad \text{بنابراین}$$

$$L[x f(x)] = -\frac{d}{dp} \left(\frac{1}{p^2+1} \right) = L\left[\frac{1}{2} \sin t\right]$$

$$\rightarrow y(t) = \sin t + \frac{1}{2} t \sin t \quad \checkmark$$

| | | | |
|------------------|--|-----|--|
| وقت ۱۲۰ دقیقه | دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران) دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر امتحان پایان ترم معادلات دیفرانسیل نیمسال اول ۸۸-۸۷ (۸۷/۱۱/۲) | 331 |  |
|------------------|--|-----|--|

| | | |
|---------------------|-----------------|-------|
| نام و نام خانوادگی: | شماره دانشجویی: | گروه: |
|---------------------|-----------------|-------|

| | |
|----|---|
| ۲۵ | ۱ اگر $xy'' - y = 0$ یک جواب معادله $y_1 = x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{(2!)(3!)}x^3 + \frac{1}{(3!)(4!)}x^4 + \dots$ باشد، جواب دوم آن را بیابید و سپس فقط فرم جواب عمومی آن را بنویسید. |
| ۲۵ | ۲ با استفاده از تغییر متغیر $z = 3\sqrt{x}$ و $u(z) = z^4 y(\frac{z^2}{9})$ معادله زیر را حل کنید $4x^2 y'' + 20xy' + (9x + 7)y = 0$ |
| ۲۰ | ۳ معادله زیر را حل کنید $y'' + 4y = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < 3, \\ t, & t \geq 3, \end{cases} \quad y(0) = y'(0) = 0$ |
| ۲۰ | ۴ مطلوب است محاسبه الف) $L\left[\frac{e^{-at} - e^{-bt}}{t}\right]$ (نمره ۷) ب) $\int_0^\infty \frac{e^{-4t} - e^{-8t}}{t} dt$ (نمره ۳) ج) $L^{-1}\left[\frac{s}{s^2 + 1} \cot^{-1}(s + 1)\right]$ (نمره ۱۰) |
| ۲۰ | ۵ با استفاده از تبدیل لاپلاس معادله زیر را حل کنید $y'' + 2ty' - 4y = 1, \quad y(0) = y'(0) = 0$ |

موفق باشید

17, 11, 2

پایان ترم ...

جواب ①:

$$r(r-1) + p_0 r + q_0 = 0$$

$$y'' - \frac{1}{x} y = 0$$

ابتدا معادله مشخصه را می یابیم:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x}\right) x^r = 0 = q_0 \rightarrow r(r-1) = 0 \rightarrow r_1 = 1, r_2 = 0 \quad r_1 - r_2 \in \mathbb{N}$$

$$y_1 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1}, \quad y_2 = c_1 y_1 \ln x + \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

سپس داریم:

$$y_1' = c_1 y_1' \ln x + c_1 y_1 \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} n b_n x^{n-1}$$

$$y_1'' = c_1 y_1'' \ln x + 2c_1 y_1' \frac{1}{x} - c_1 y_1 \frac{1}{x^2} + \sum_{n=2}^{\infty} b_n \cdot n \cdot (n-1) x^{n-2}$$

حال متغیرها را در معادله جایگزینی کنیم. داریم:

$$c_1 y_1'' \ln x + 2c_1 y_1' - c_1 y_1 \frac{1}{x} + \sum_{n=2}^{\infty} n \cdot b_n \cdot (n-1) \cdot x^{n-2} - c_1 y_1 \ln x - \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = 0$$

$$c_1 \ln x (y_1'' - y_1) + 2c_1 y_1' - c_1 y_1 \frac{1}{x} + \sum_{n=2}^{\infty} n(n+1) b_{n+1} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = 0$$

$$2c_1 y_1' - c_1 y_1 \frac{1}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2c_1 x^n}{(n!)^2} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_1 x^n}{n!(n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_1 x^n}{(n!)^2} \left(2 - \frac{1}{n+1}\right)$$

$$\Rightarrow c - b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{c}{(n!)^2} \left(2 - \frac{1}{n+1}\right) + n(n+1) b_{n+1} - b_n \right] x^n = 0$$

$$b_0 = c, \quad \frac{b_0}{(n!)^2} \left(2 - \frac{1}{n+1}\right) + n(n+1) b_{n+1} - b_n = 0$$

حال دنباله ضرایب را می یابیم:

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2 = c_1 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} + c_2 \left(c_1 y_1 \ln x + \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right)$$

جواب ②:

$$y = z^{-\frac{r}{q}} u(z), \quad x = \frac{z}{q}$$

$$y' = -\frac{r}{q} z^{-\frac{r}{q}-1} u(z) + z^{-\frac{r}{q}} u'(z) z'$$

شماره ای منفی

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

معادلات دیفرانسیل

۳۳

$$y'' = \gamma_0 z^{-7} u(z) - 4 z^{-7} u'(z) - 4 z^{-7} u z'' - 4 z^{-7} u(z) + z u'(z)^2 + z^{-4} u'(z)$$

$$\frac{dx}{dz} = \frac{2z}{9} \rightarrow z' = \frac{9}{2z}, \quad z' = \frac{3}{2} x^{-1/2}$$

$$z'' = -\frac{3}{4} x^{-3/2} = -\frac{3}{4} \left(\frac{z}{3}\right)^{-3}$$

در معادله اصلی، پس از جایگزینی متغیرها، باید معادله بصورت $F(u'', u', u, z) = 0$ درآید. یعنی z'' در z بر حسب z

نیستیم. پس از جایگزینی رکاد معادله داریم:

$$\frac{4}{11} u''(z)^2 + \frac{4}{11} u'(z)^2 + \frac{4}{11} u'(z)^2 (-4z^{-1}) + \frac{4}{11} u'(-4z^{-1})(z)^2 + \frac{4}{11} u(\gamma_0 z^{-7})(z)^2$$

$$+ \frac{4}{11} u(-4z^{-1}) z'' + \frac{\gamma_0}{9} u'(z) z^{-7} + \frac{\gamma_0}{9} u(-4z^{-3}) z' + u z'' + \gamma u z^{-4} =$$

$$u'' + u' z^{-1} - 9 u z^{-7} + u(z) = 0 \quad \times z^7 \rightarrow z^7 u'' + z^7 u' + (z^7 - 9) u = 0 \quad \text{سوی مرتبه ۳}$$

$$u(z) = C_1 J_3(z) + C_2 Y_3(z), \quad z = \sqrt[3]{x} \rightarrow$$

$$11 x^7 y(x) = C_1 J_3(\sqrt[3]{x}) + C_2 Y_3(\sqrt[3]{x}) \rightarrow$$

$$y(x) = \frac{C_1}{11} x^{-7} J_3(\sqrt[3]{x}) + \frac{C_2}{11} x^{-7} Y_3(\sqrt[3]{x}) \quad \checkmark$$

جواب - (۳):

$$y'' + 4y = t \quad H(t-3) = t u(t-3)$$

$$\xrightarrow{\text{لاپلاس}} s^2 L[y] - s y(0) - y'(0) + 4 L[y] = \frac{d}{ds} \left(\frac{e^{-3s}}{s} \right)$$

$$(s^2 + 4) L[y] = \left(\frac{4s+1}{s^2} \right) e^{-3s} \rightarrow L(y) = \frac{4s+1}{s^2(s^2+4)} e^{-3s}$$

$$L[u(t-a) f(t-a)] = e^{-as} L[f(t)]$$

می دانیم که:

$$Y(s) = \left(\frac{4}{s} \frac{1}{s} + \frac{1}{s} \frac{1}{s^2} - \frac{4}{s} \frac{s}{s^2+4} - \frac{1}{s} \frac{1}{s^2+4} \right) e^{-3s} \Rightarrow$$

تجزیه جبری

راشده ریاضی و علوم کامپیوتر

معادلات دیفرانسیل

$$\approx L^{-1} \left[L \left[\frac{1}{s} + \frac{1}{s} \right] - \frac{1}{s} \cos^2(t-3) - \frac{1}{s} \sin^2(t-3) \right]$$

$$u(t-3) \left[\frac{1}{s} + \frac{1}{s} (t-3) - \frac{1}{s} \cos^2(t-3) - \frac{1}{s} \sin^2(t-3) \right] \checkmark$$

جواب (۴) الف :

ی دانیم : $L \left[\frac{f(u)}{n} \right] = \int_p^\infty f(u) du$ پس داریم :

$$L \left[\frac{1}{t} (e^{-at} - e^{-bt}) \right] = \int_p^\infty \left(\frac{1}{u+a} - \frac{1}{u+b} \right) du = L \ln \frac{u+a}{u+b} \Big|_p^\infty = L \ln \frac{p+b}{p+a} \checkmark$$

ب :

ی دانیم نتیجه مهم قضیه : $L \left[\frac{f(u)}{n} \right] = \int_p^\infty f(u) du$ به صورت $\int_0^\infty \frac{f(u)}{n} du = \int_0^\infty f(p) dp$

$$\int_0^\infty \frac{e^{-pt} - e^{-at}}{t} dt = \int_0^\infty \left(\frac{1}{p+p} - \frac{1}{p+a} \right) dp = L \ln \frac{p+p}{p+a} \Big|_0^\infty$$

پس داریم :

$$= L \ln \frac{a}{p} = L \ln 2 \checkmark$$

ج :

باتوجه به کانولوشن داریم : $\int_0^t f(t-x) g(x) dx = L^{-1} [F(s) G(s)] = \int_0^t f(x) g(t-x) dx$

پس داریم : $F(s) = \frac{s}{s^2+1}$ ، $G(s) = \cot^{-1}(s+1)$ در نتیجه :

$$f(t) = \cos t \quad L[-x f(x)] = \frac{d}{dp} f(p) \rightsquigarrow f(x) = \frac{1}{n} L^{-1} \left[\frac{d}{dp} F(p) \right]$$

$$g(t) = \frac{1}{t} L^{-1} \left[\frac{-1}{1+(s+1)^2} \right] = \frac{1}{t} e^{-t} \sin t$$

$$\Rightarrow L^{-1} [F(s) G(s)] = \int_0^t \cos(t-x) \frac{e^{-x} \sin x}{x} dx \checkmark$$

جواب (۵) :

$$s'Y - sY(0) - y'(0) - \frac{d}{ds} (sY - y(0)) - FY = \frac{1}{s}$$

شماره ای صفتی

دانشگاه رازی و علوم کامپیوتر

معادلات دیفرانسیل

۳۲

ع

$$s^r Y - 7Y - rsY = \frac{1}{s} \Rightarrow Y - \left(\frac{s-1}{rs} \right) Y = \frac{1}{rs^r} \Rightarrow$$

$$Y(s) = e^{\int \frac{s^r-7}{rs} ds} \left[\int e^{\int \frac{-s^r+7}{rs} ds} \frac{1}{rs^r} ds \right] = \frac{e^{\frac{s^r}{r}}}{s^r} \left[\int \frac{-s}{r} e^{-\frac{s^r}{r}} ds \right]$$

$$= \frac{1}{s^r} = L\left[\frac{1}{r} t^r\right] \Rightarrow y(t) = \frac{t^r}{r} \checkmark$$



| | |
|---|--|
| ۱ | معادله دیفرانسیل $xy'' + (1+x)y' - y = 0$ را در نظر بگیرید. الف) جواب عمومی، به صورت سری، حول $x_0 = 1$ را بیابید (۱۲ نمره) ب) فقط فرم جواب عمومی، به صورت سری، حول $x_0 = 0$ را بیابید (۱۰ نمره). |
| ۲ | با استفاده از تغییر متغیر $x = t^3$ معادله $9x^2y'' + 9xy' + x^{2/3}y = 0$ را حل کنید. (۱۵ نمره) |
| ۳ | تبدیل لاپلاس زیر را محاسبه کنید (۱۸ نمره) $xe^{2x} \int_0^x t^{1/2} \frac{\sin(x-t)}{x-t} dt$ |
| ۴ | تبدیلات زیر را محاسبه کنید الف) $\mathcal{L}(\sin x) = ?$ (۱۰ نمره) ب) اگر $F(s) = \mathcal{L}[\sin(\sqrt{t})]$ با توجه به راهنمایی زیر $F(s)$ را بیابید (۱۵ نمره) راهنمایی: تابع $\sin(\sqrt{t})$ یک جواب خصوصی $4ty''(t) + 2y'(t) + y(t) = 0$ می باشد و $F(1) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-1/4}$ |
| ۵ | مطلوب است حل معادله انتگرالی زیر (۱۰ نمره) $y(t) = \sin(t) - \int_0^t \cos x y'(t-x) dx, \quad y(0) = 0$ |
| ۶ | معادله $\begin{cases} 2y'' + y' + 2y = g(x) \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$ را حل کنید به طوری که $g(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 5 \\ 1, & 5 \leq x \leq 20 \\ 0, & x > 20 \end{cases}$ (۲۰ نمره) |

موفق باشید

۸۶، ۱۴، ۱۲

بیان اثر معادلات دیفرانسیل

جواب (الف):

$$xy'' + (1+x)y' - y = 0$$

$$X = x-1 \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dX} \xrightarrow{\text{جایگزینی}} (X+1) \frac{dy}{dX} + (X+2) \frac{dy}{dX} - y = 0$$

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n X^n ; y' = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n X^{n-1} ; y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n X^{n-2}$$

$$(X+1) \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n X^{n-2} + (X+2) \sum_{n=1}^{\infty} n c_n X^{n-1} - \sum_{n=0}^{\infty} c_n X^n = 0$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n X^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} n(n-1) c_n X^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} n c_n X^n + \sum_{n=1}^{\infty} 2n c_n X^{n-1} - \sum_{n=0}^{\infty} c_n X^n = 0$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1) c_{n+1} X^n + \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2) c_{n+1} X^n + \sum_{n=1}^{\infty} n c_n X^n + \sum_{n=0}^{\infty} 2(n+1) c_{n+1} X^n - \sum_{n=0}^{\infty} c_n X^n = 0$$

$$2c_1 + 2c_1 - c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [n(n+1)c_{n+1} + (n+1)(n+2)c_{n+1} + n c_n + 2(n+1)c_{n+1} - c_n] X^n = 0$$

$$c_0 = 2(c_1 + c_1) \rightarrow c_1 = \frac{1}{4} c_0 - c_1$$

$$n=1: 2c_1 + 2c_1 + c_1 + 4c_1 - c_1 = 0 \rightarrow c_1 = -c_1$$

$$n=2: 2c_2 + 4c_2 + 2c_2 + 6c_2 - c_1 = 0 \rightarrow c_2 = \frac{11}{12} c_1$$

$$n=3: 4c_3 + 6c_3 + 2c_3 + 8c_3 - c_2 = 0 \rightarrow c_3 = \frac{-71}{3} c_1$$

$$\rightarrow y = c_0 + c_1(x-1) + c_2(x-1)^2 - c_3(x-1)^3 + \frac{11}{12} c_1(x-1)^4 - \frac{71}{3} c_1(x-1)^5 + \dots$$

(-)

$$y'' + \frac{1+x}{x} y' - \frac{1}{x} y = 0 \quad x \cdot \frac{1+x}{x} = 1+x, \quad x^2 \cdot \frac{-1}{x} = -x$$

برای $n=0$ نقطه غیر عادی منظم است. معادله شافلی: $r(r-1) + r = 0 \rightarrow r^2 = 0 \rightarrow r = 0$ مضاعف

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \quad y' = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1} \quad y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2}$$

شورای علمی

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

معادلات دیفرانسیل

۲۵

$$x \sum_{n=r}^{\infty} n(n-1) C_n x^{n-1} + (1+x) \sum_{n=1}^{\infty} n C_n x^{n-1} - \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = 0 \rightarrow$$

$$\sum_{n=r}^{\infty} n(n-1) C_n x^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} n C_n x^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} n C_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = 0 \rightarrow$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1) C_{n+1} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) C_{n+1} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} n C_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n = 0 \rightarrow$$

$$C_1 - C_0 = 0, \quad \sum_{n=1}^{\infty} [n(n+1) C_{n+1} + (n+1) C_{n+1} + n C_n - C_n] x^n = 0$$

$$n=1: 7C_2 + 2C_2 + C_1 - C_1 = 0 \rightarrow C_2 = 0$$

$$(n+1)^r C_{n+1} = (1-n) C_n \rightarrow$$

$$C_{n+1} = \frac{1-n}{(n+1)^r} C_n \rightarrow C_r = C_F = \dots = 0$$

$$y = C_0 + C_1 x = C_0 + C_0 x \checkmark$$

جواب (۲):

$$x = t^r \rightarrow t = \sqrt[r]{x} \quad \frac{dt}{dx} = \frac{1}{r} x^{-1/r} = \frac{1}{r t^{r+1}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{r t^{r+1}} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{r t^{r+1}} \cdot \frac{dy}{dt} \right] = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{r t^{r+1}} \right) \cdot \frac{dt}{dx} \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{1}{r t^{r+1}} \cdot \frac{d^2 y}{dt^2} \cdot \frac{dt}{dx} =$$

$$\frac{-r}{r t^{r+2}} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{r t^{r+1}} \frac{d^2 y}{dt^2}$$

$$r t^7 \left[\frac{-r}{r t^{r+2}} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{r t^{r+1}} \frac{d^2 y}{dt^2} \right] + r t^r \frac{1}{r t^{r+1}} \frac{dy}{dt} + t^r y = 0$$

جابجایی در معادله:

$$-r t \frac{dy}{dt} + t^r \frac{d^2 y}{dt^2} + r t \frac{dy}{dt} + t^r y = 0 \rightarrow t \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} + t y = 0 \rightarrow$$

$$L \left[t \frac{d^2 y}{dt^2} \right] = - \frac{d}{ds} (s^r Y + S y(0) + y'(0)) \rightarrow L[t y] = - \frac{d}{ds} (Y)$$

$$-r s Y - s^r Y' - y(0) + s Y + y(0) - Y' = 0 \rightarrow \frac{Y'}{Y} = \frac{-r s}{s^r + 1}$$

$$\frac{dY}{Y} = \frac{-r s}{s^r + 1} ds \rightarrow \ln Y = - \int \frac{du}{u} = - \ln u = \ln u^{-1} = \ln (s^r + 1)^{-1}$$

شماره ای: ۰۰۰۰۰۰

آشنایی با مهندسی عمران

معادلات دیفرانسیل

$$\rightarrow Y = C(s+1) \rightarrow J = -L\left[\frac{1}{s+1}\right] = -L\left[\frac{1}{s+1}\right] = -\frac{1}{s+1}$$

جواب (د):

$$F(p) = L\left[n e^{\frac{1}{r}x} \int_0^x \frac{\sin(x-t)}{x-t} dt\right] = -\frac{d}{dp} F_1'(p)$$

$$F_1(p) = L\left[e^{\frac{1}{r}x} \int_0^x \frac{\sin(x-t)}{x-t} dt\right] = F_r(p-r)$$

$$F_r(p) = L\left[\int_0^x \underbrace{t}_{f(t)} \underbrace{\frac{\sin(x-t)}{x-t}}_{g(t)} dt\right] \stackrel{\text{تبدیل}}{=} F(p) G(p)$$

$$F(p) = L\left(x^{\frac{1}{r}}\right) = \frac{\Gamma\left(\frac{r}{r}\right)}{p^{\frac{r}{r}}}, \quad G(p) = L\left(\frac{\sin x}{x}\right) = \int_0^\infty \frac{1}{1+u^2} du = \frac{\pi}{r} - \text{Arctan } p$$

$$\rightarrow F_r(p) = \frac{\Gamma\left(\frac{r}{r}\right)}{p^{\frac{r}{r}}} \left(\frac{\pi}{r} - \text{Arctan } p\right) \rightarrow$$

$$F_1(p) = \frac{\Gamma\left(\frac{r}{r}\right)}{(p-r)^{\frac{r}{r}}} \left(\frac{\pi}{r} - \text{Arctan } (p-r)\right) \rightarrow$$

$$F(p) = -\frac{d}{dp} F_1'(p) \Rightarrow F(p) = \frac{r}{r} \Gamma\left(\frac{r}{r}\right) (p-r)^{-\frac{r}{r}} \left(\frac{\pi}{r} - \text{Arctan } (p-r)\right) +$$

$$\frac{\Gamma\left(\frac{r}{r}\right)}{(p-r)^{\frac{r}{r}}} \times \frac{1}{1+(p-r)^2}$$

جواب (ف) الف):

$$L(|\sin x|) = \frac{1}{1-e^{-\pi s}} \int_0^\pi e^{-st} \sin t dt \quad |\sin x| \text{ تابع متناوب با دوره تناوب } \pi \text{ است.}$$

$$\int e^{-st} \sin t dt = \frac{1}{1+\frac{1}{s^2}} \left[\frac{-1}{s} \sin t e^{-st} - \frac{1}{s^2} e^{-st} \cos t \right]$$

$$L[|\sin x|] = \frac{1}{1-e^{-\pi s}} \left[\frac{1}{1+\frac{1}{s^2}} \left(\frac{1}{s} e^{-s\pi} + \frac{1}{s^2} \right) \right] = \frac{s}{(1-e^{-\pi s})(s^2+1)} \left[e^{-s\pi} + \frac{1}{s} \right]$$

(س):

$$L\left({}^L y''(t)\right) = \frac{d}{ds} L(y''(t)) = \frac{d}{ds} [s^2 Y + s Y(0) + Y'(0)] =$$

شورای صنفی

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

معادلات دیفرانسیل

$$-r^2 s Y - s^2 Y - Y(0) \quad \leadsto \quad \{Y = L[y]\}$$

$$r[-r^2 s Y - s^2 Y - Y(0)] + r[s Y + Y(0)] + Y = 0 \quad \leadsto$$

$$-r s^2 Y' + (-r^2 s + 1) Y = 0 \quad \leadsto \quad \frac{dY}{Y} = \frac{1 - r^2 s}{r s^2} ds \quad \leadsto \quad \ln Y = \frac{1}{r s} - \frac{r}{r} \ln s$$

$$\leadsto Y = c e^{-\frac{1}{r s}} \cdot s^{-r/r} \quad \frac{\sqrt{\pi}}{r} e^{-1/r} = f(1) = c e^{-1/r} \Rightarrow c = \frac{\sqrt{\pi}}{r}$$

$$\checkmark Y = f(s) = \frac{\sqrt{\pi}}{r} e^{-1/r s} \cdot s^{-r/r}$$

پس:

جواب (۵):

$$Y = \frac{1}{s^2 + 1} - \left[s Y \cdot \frac{s}{s^2 + 1} \right]$$

از طرفین لاپلاس می گیریم و به سمت فرکانس کانولوشن داریم:

$$Y(s^2 + 1) = 1 - s^2 Y \quad \leadsto \quad Y = \frac{1}{1 + r s^2} = \frac{1}{r(\frac{1}{r} + s^2)} \quad \leadsto \quad f(t) = \frac{\sqrt{r}}{r} \sin \frac{t}{\sqrt{r}}$$

$$r y'' + y' + r y = g(n) = u_{\Delta}(n) - u_{r_0}(n)$$

جواب (۶):

$$r p^2 L[y] - r p y(0) - r y'(0) + p L[y] - y(0) + r L[y] = \frac{e^{-\delta p}}{p} - \frac{e^{-r_0 p}}{p}$$

از تبدیل لاپلاس:

$$(r p^2 + p + r) L[y] = \frac{e^{-\delta p}}{p} - \frac{e^{-r_0 p}}{p} \quad \leadsto \quad L[y] = \frac{e^{-\delta p} - e^{-r_0 p}}{p(r p^2 + p + r)}$$

$$y(n) = \frac{1}{r} L^{-1} \left[\frac{e^{-\delta p} - e^{-r_0 p}}{p \left[(p + \frac{1}{r})^2 + \frac{15}{17} \right]} \right]$$

$$L^{-1} \left[\frac{1}{s^2 + \frac{15}{17}} \right] = \frac{F}{\sqrt{15}} \sin \frac{\sqrt{15}}{F} t$$

حل با توجه به نتایجین داریم:

$$L^{-1} \left[\frac{1}{(s + \frac{1}{r})^2 + \frac{15}{17}} \right] = e^{-\frac{1}{r} t} \frac{F}{\sqrt{15}} \sin \frac{\sqrt{15}}{F} t$$

$$L^{-1} \left[\frac{1}{s} \times \frac{1}{(s + \frac{1}{r})^2 + \frac{15}{17}} \right] = \int_0^t e^{-\frac{1}{r} u} \frac{F}{\sqrt{15}} \sin \frac{\sqrt{15}}{F} u \, du =$$

$$\frac{F}{\sqrt{15}} \left[\frac{e^{-\frac{1}{r} u}}{\frac{1}{17} + \frac{15}{17}} \left(-\frac{1}{F} \sin \frac{\sqrt{15}}{F} u - \frac{\sqrt{15}}{F} \cos \frac{\sqrt{15}}{F} u \right) \right]_0^t =$$

$$\frac{F}{\sqrt{15}} \left[e^{-\frac{1}{r} t} \left(-\frac{1}{F} \sin \frac{\sqrt{15}}{F} t - \frac{\sqrt{15}}{F} \cos \frac{\sqrt{15}}{F} t \right) + \frac{\sqrt{15}}{F} \right] = e^{-\frac{1}{r} t} \left(-\frac{1}{\sqrt{15}} \sin \frac{\sqrt{15}}{F} t - \cos \frac{\sqrt{15}}{F} t \right) + \frac{\sqrt{15}}{F}$$

شماره ای عشق

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

معادلات دیفرانسیل



دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

امتحان پایان ترم معادلات دیفرانسیل

نیمسال دوم ۸۶-۸۵ (۴ بهمن ۸۵)

وقت
۱۲۰ دقیقه

نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

گروه:

| | |
|----|---|
| ۳۰ | الف) تابع بسل نوع دوم از مرتبه صفر را به دست آورید. $(Y_0(x) = ?)$ ب) فقط فرم کلی تابع بسل نوع دوم از مرتبه یک را بنویسید. |
| ۲۵ | الف) نشان دهید $\frac{d}{dx}[J_0(x)] = -J_1(x)$ ب) اگر $\mathcal{L}[J_0(x)] = \frac{1}{\sqrt{s^2 + 1}}$ آن گاه مطلوب است محاسبه لاپلاس $J_1(ax)$ |
| ۳۰ | معادله زیر را حل کنید $\begin{cases} 2y'(t) = -y(t) + e^t - \int_0^t e^{t-x} y'(x) dx \\ y(0) = 1 \end{cases}$ |
| ۳۵ | مطلوب است الف) $\mathcal{L}[e^{x-1}] = ?$ ب) $\mathcal{L}\left[e^{4t} \int_0^t \frac{1}{x} e^{-4x} \sin(3x) dx\right] = ?$ ج) $L^{-1}\left[e^{-\pi s} \frac{1}{(s-1)^4 - 16}\right] = ?$ د) $\mathcal{L}[\sin(\sqrt{t})] = ?$ |

موفق باشید

۳۷

۱۵, ۱۱, ۴

پایان ترم معادلات دیفرانسیل

مثال ۱ الف) معادله دیفرانسیل بنویس $x^2 y'' + xy' + (x^2 - 1)y = 0$ که در آن $y(1) = 0$ و $y(2) = 1$ را در نظر بگیرید.
معادله دیفرانسیل را بنویسید.

$$y(x) = J_0(x) \ln x + \sum_{m=1}^{\infty} a_m x^m \quad y'(x) = J_0'(x) \ln x + \frac{1}{x} J_0(x) + \sum_{m=1}^{\infty} m a_m x^{m-1}$$

$$y''(x) = J_0''(x) \ln x + \frac{2}{x} J_0'(x) - \frac{1}{x^2} J_0(x) + \sum_{m=2}^{\infty} m(m-1) a_m x^{m-2}$$

با جایگذاری در معادله: $xy'' + y' + xy = 0$

$$x J_0''(x) \ln x + 2 J_0'(x) + J_0(x) \ln x + x J_0'(x) \ln x + \sum_{m=1}^{\infty} m^2 a_m x^m + \sum_{m=1}^{\infty} a_m x^{m+1} = 0$$

$$\ln x (x J_0''(x) + J_0'(x) + x J_0'(x)) = 0$$

$$J_0(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{r^m (m!)^2} x^{2m}$$

$$J_0'(x) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m}{r^{m-1} m! (m-1)!} x^{2m-1}$$

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m}{r^{m-1} m! (m-1)!} x^{2m-1} + \sum_{m=1}^{\infty} m a_m x^{m-1} + \sum_{m=1}^{\infty} a_m x^{m+1} = 0$$

$$a_1 = 0 \quad -1 + r a_r = 0 \Rightarrow a_r = \frac{1}{r} \quad \dots \quad (r(n+1)) a_{r(n+1)} + a_{rn} = 0$$

$$a_1 = 0 \Rightarrow a_r = 0, a_{2r} = 0, \dots, a_{rn+1} = 0$$

$$\frac{(-1)^{n+1}}{r^{n+1} (n+1)! n!} + (r(n+1)) a_{r(n+1)} + a_{rn} = 0$$

$$n=1: \frac{1}{r^2} + 17 a_r + a_r = 0, \quad a_r = \frac{-r}{12r}$$

$$a_{rn} = \frac{(-1)^{n-1}}{r^n (n!)^2} \left(1 + \frac{1}{r} + \dots + \frac{1}{n} \right)$$

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

معادلات دیفرانسیل

$$y_r(x) = J_0(x) \ln x + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m L_m}{r^{2m} (m!)^2} x^{2m}$$

حال ترکیبی $a(y_r(x) + bJ_0(x))$ برای $a = \frac{r}{\pi}$ و $b = 8 - \ln r$ که ثابت

اولیه است، تابعی به نوع هم مرتبه می باشد. یعنی:

$$Y_r(x) = \frac{r}{\pi} \left[J_0(x) \left(\ln \frac{x}{r} + 8 \right) + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m-1} L_m}{r^{2m} (m!)^2} x^{2m} \right]$$

(ب)

$$Y_1(x) = \frac{r}{\pi} \left(\ln \frac{x}{r} + 8 \right) J_1(x) - \frac{1}{\pi} - \frac{1}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{L_m + L_{m+1}}{m! (m+1)!} \left(\frac{x}{r} \right)^{2m+1}$$

$$L_0 = 0, \quad L_p = 1 + \frac{1}{r} + \dots + \frac{1}{p} \quad ; \quad p = 1, 2, \dots$$

جواب (۲): الف)

$$J_0(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{r^{2m} (m!)^2} x^{2m}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} J_0(x) &= \sum_{m=1}^{\infty} \frac{r^m (-1)^m}{r^{2m} (m!)^2} x^{2m-1} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{r^{m+1} (-1)^{m+1}}{r^{2(m+1)} ((m+1)!)^2} x^{2(m+1)-1} \\ &= (-1) x \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{r^{2m+1} m! (m+1)!} x^{2m} = -J_1(x) \quad \checkmark \end{aligned}$$

(ج)

$$L(J_1(ax)) = L\left(-\frac{1}{a} \frac{d}{dx} (J_0(ax))\right) = -\frac{1}{a} L\left(\frac{d}{dx} (J_0(ax))\right) =$$

$$= -\frac{1}{a} \left[s L(J_0(ax)) - J_0(0) \right] = -\frac{s}{a} \cdot \frac{1}{a} \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{s}{a}\right)^2 + 1}} \quad \checkmark$$

$$\left(L(f(bt)) = \frac{1}{b} F\left(\frac{s}{b}\right) : L(f(t)) = F(s) \right)$$

جواب (۳):

از خواص لاپلاس می نویسیم. با توجه به اینکه e^x و $J_1(x)$ می باشد، داریم:

شماره ای عمومی

معادلات دیفرانسیل

دانشگاه ریاضی و علوم کامپیوتر

$$Y(sY - r) = Y(sY - r)(s-1) = -Y + \frac{r}{s-1} - (sY - r) \left(\frac{1}{s-1} \right)$$

$$Y \left[(s+1) + \frac{s}{s-1} \right] = Y \left[1 + \frac{1}{s-1} \right]$$

$$Y = L[y]$$

$$Y = \frac{rs}{(rs+1)(s-1)+s} = \frac{rs}{rs^2-1} = \frac{s}{s^2-\frac{1}{r}}$$

$$y(t) = \cosh \left(\frac{\sqrt{r}}{r} t \right) \quad \checkmark$$

جواب (ف): (الف)

$$\begin{aligned} L(e^{n-[n]}) &= \int_0^\infty e^{-st} e^{t-[t]} dt = \int_0^\infty \frac{e^{(1-s)t}}{e^{[t]}} dt = \sum_{n=0}^\infty \int_n^{n+1} \frac{e^{(1-s)t}}{e^n} dt \\ &= \sum_{n=0}^\infty e^{-n} \int_n^{n+1} e^{(1-s)t} dt = \sum_{n=0}^\infty e^{-n} \left[\frac{e^{(1-s)t}}{1-s} \right]_{t=n}^{t=n+1} \\ &= \frac{1}{1-s} \sum_{n=0}^\infty e^{-n} [e^{n+1-ns-s} - e^{n-ns}] = \frac{1}{1-s} \sum_{n=0}^\infty (e^{1-ns-s} - e^{-ns}) \\ &= \frac{1}{1-s} \sum_{n=0}^\infty e^{-ns} (e^{1-s} - 1) = \frac{e^{1-s} - 1}{1-s} \sum_{n=0}^\infty e^{-ns} = \frac{e^{1-s} - 1}{1-s} \cdot \frac{1}{1-e^{-s}} \quad \checkmark \end{aligned}$$

(ب)

$$\begin{aligned} L\left(\frac{1}{n} e^{-fn} \sin \pi n\right) &= ? \quad L\left(\frac{1}{n} \sin \pi n\right) = \int_0^\infty \frac{r}{t^2+q} dt = \left[\tan^{-1} \frac{t}{r} \right]_0^\infty \\ &= \frac{\pi}{r} - \tan^{-1} \frac{s}{r} \quad L(\sin \pi n) = \frac{r}{s^2+q}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \pi n}{n} = 0 \end{aligned}$$

$$L\left(\frac{1}{n} e^{-fn} \sin \pi n\right) = \frac{\pi}{r} - \tan^{-1} \frac{s+f}{r}$$

$$L\left(\int_0^t \frac{1}{n} e^{-fn} \sin \pi n \, dn\right) = \frac{1}{s} \left[\frac{\pi}{r} - \tan^{-1} \frac{s+f}{r} \right]$$

$$L\left(e^{ft} \int_0^t \frac{1}{n} e^{-fn} \sin \pi n \, dn\right) = \frac{1}{s-f} \left(\frac{\pi}{r} - \tan^{-1} \frac{s}{r} \right) \quad \checkmark$$

(ج)

$$L^{-1}\left[\frac{1}{s^2-17}\right] = L^{-1}\left[\frac{1}{(s^2-4)(s^2+4)}\right] = L^{-1}\left[\frac{\frac{1}{4}}{s^2-4} + \frac{-\frac{1}{4}}{s^2+4}\right]$$

توابع عكسي

معادلات ديفرانسيال

دانشگاه تهران و علوم کامپیوتر

$$= L^{-1} \left[\frac{\frac{1}{\lambda}}{s^2 - 4} \right] + L^{-1} \left[\frac{\frac{-\lambda}{s^2 + 4}}{s^2 + 4} \right] = \frac{1}{17} [\sinh 2t - \sin 2t]$$

$$L^{-1} \left[\frac{1}{(s-1)^2 - 17} \right] = e^t \frac{1}{17} [\sinh 2t - \sin 2t]$$

$$L^{-1} \left[e^{-\pi s} \frac{1}{(s-1)^2 - 17} \right] = u_{\pi}(t) e^{t-\pi} \frac{1}{17} [\sinh 2(t-\pi) - \sin 2(t-\pi)]$$

$$u_{\pi}(t) = \begin{cases} 0 & t < \pi \\ 1 & t > \pi \end{cases}$$

(۷)

ی‌تایم تابع $\sin(\sqrt{t})$ یک جواب خصوصی معادله $4y'' + 2y' + y = 0$ می‌باشد.

$$F(1) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-1/4}$$

$$L(y''(t)) = \frac{-d}{ds} L(y'(t)) = \frac{-d}{ds} [sY + sY(0) + Y'(0)] =$$

$$-2sY - s^2 Y' - Y(0)$$

$$4[-2sY - s^2 Y' - Y(0)] + 2[sY + Y(0)] + Y = 0$$

$$-8sY - 4s^2 Y' - 4Y(0) + 2sY + 2Y(0) + Y = 0$$

$$\frac{dy}{y} = \frac{1-7s}{4s^2} ds \rightarrow \ln y = \frac{-1}{4s} - \frac{7}{4} \ln s \rightarrow$$

$$y = C e^{\frac{-1}{4s}} s^{-7/4}$$

$$\frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-1/4} = F(1) = C e^{-1/4} \Rightarrow C = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$y = F(s) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-1/4s} s^{-7/4}$$

س:

امتحان پایان ترم معادلات دیفرانسیل

مدت : ۱۲۰ دقیقه (۸۹/۴/۱)

شماره دانشجویی :

نام و نام خانوادگی :

نام استاد:

۱- تابع زیر را در نظر بگیرید:

(۲۰ نمره)

$$f(x) = 2x^3 + 2x^2 + 1$$

این تابع را بر حسب چند جمله‌ای لژاندار بنویسید و سپس انتگرال زیر را بر حسب مقادیر مختلف n محاسبه نمایید:

$$\int_1^1 f(x) P_n(x) dx$$

۲- (الف) نشان دهید $x=0$ یک نقطه غیرعادی منظم معادله زیر است:

$$4x^2 y'' - 8x^2 y' + (4x^2 + 1)y = 0$$

(ب) در همسایگی $x=0$ جواب عمومی معادله را به دست آورید. (۲۵ نمره)

۳- (الف) معادله دیفرانسیل-انتگرال زیر را به کمک تبدیل لاپلاس حل نمایید. (۱۵ نمره)

$$y'(x) + 2y(x) + \int_0^x y(t) dt = 0, y(0) = 1$$

$$L^{-1}\left(\frac{(s+1)e^{-\pi s}}{s^2 + s + 1}\right) \quad \text{(ب) مطلوبست محاسبه}$$

(۱۰ نمره)

۴- اگر $\Gamma(r) = \int_0^\infty x^{r-1} e^{-x} dx$ برای $x > 0$ مقدار $\Gamma'(1)$ را محاسبه نمایید و سپس نشان

$$L(Ln(t)) = \frac{\Gamma'(1) - Ln(s)}{s} \quad \text{دهید}$$

۵- دستگاه زیر را حل کنید:

$$\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

(موفق باشید)

۵

ی. ل. س.

* خلاصه و مروری بر مباحث معادلات دیفرانسیل

حل معادلات دیفرانسیل به کمک سریها؛ "مقدمه ای بر سریهای توانی"

اگر $\{a_n\}$ دنباله دلخواهی از اعداد حقیقی یا مختلط باشد، سری $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ یک سری توانی حول x_0 گفته می شود.

شیع هر یک از سریهای توانی: عدد مثبت R شعاع همگرایی $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ می نامند. در صورتی که برای

x های که $|x-x_0| < R$ باشد، سری همگرا و برای x های که $|x-x_0| > R$ باشد، سری واگرا شود.

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n \text{ برای } x \text{ به شعاع همگرایی } R \text{ : } \frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \quad \text{یا} \quad \frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

سری تیلور وینف کوش تابع $f(x)$: اگر تابع $f(x)$ دارای مشتقات تا هر مرتبه دلخواه در نقطه x_0 باشد، سری تیلور

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$$

اگر $x_0 = 0$ باشد، سری فوق را سری مک لورین تابع $f(x)$ می نامند.

تعریف: اگر سری تیلور تابع $f(x)$ حول x_0 در یک همبستگی آن یعنی مجموعه $|x-x_0| < R$ تابع $f(x)$ همگرا باشد، $f(x)$ در x_0 محلی می نامند.

نمونه: توابع جیبی $\sin x$ و $\cos x$ و e^x در هر نقطه دلخواه محلی و دارای شعاع همگرایی $R = \infty$ است.

نمونه: توابع $\frac{1}{x+1}$ ، $\ln(1+x)$ و $\tan^{-1}(x)$ در $x=0$ محلی و دارای شعاع همگرایی $R=1$ است.

نمونه: اگر تابع $f(x)$ در x_0 محلی باشد، توابع $f \pm g$ و $f \cdot g$ نیز محلی اند. f/g در صورتی که $g(x_0) \neq 0$ باشد، در x_0 محلی است.

نقطه حل معادله دیفرانسیل حل نقطه عادی: نقطه x_0 برای معادله $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$

نقطه عادی می نامیم اگر $p(x)$ ، $q(x)$ و $f(x)$ در x_0 محلی باشند.

نمونه: در صورتی که x_0 نقطه عادی معادله دیفرانسیل $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ باشد، این صورت

معادله دارای دو جواب مستقل خطی به شکل سری توانی حل $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ است.

شماره ای عشق

معادلات دیفرانسیل

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

روش بېست آوردن جواب معادله در نقطه عادي: جواب معادله بصورت $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ است. بابت

برای بېست آوردن a_n بايستی y را در معادله صق دهيم:

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$$

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-x_0)^{n-1}$$

$$y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n (x-x_0)^{n-2}$$

حال x را در معادله صق می دهيم و فرض سدي که بايکد بتر هم از طرفی دهيم تا رابطه باز نشستی برای a_n بېست آوريم.

مثلاً سوم: اگر $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ جواب ساله معادله اوليه باشد، ضارب a_n از رابطه زیر بېست می آيد:

(روش متقاصالی / روش ليبنيتز - مک کین) $\dots, a_1 = y'(x_0), a_0 = y(x_0) \Rightarrow a_n = \frac{y^{(n)}(x_0)}{n!}$

مثال طلای: چهار طبل اول سری جواب معادله $y''' + (y')^2 = e^x$ با سله اوليه $y(0)=1, y'(0)=2$ است.

$$\left[a_0 = y(0) = 1 \right] \quad \left[a_1 = y'(0) = 2 \right] \quad \left[a_2 = \frac{y''(0)}{2!} = \frac{?}{2} = -\frac{3}{2} \right]$$

$$x=0 \Rightarrow y''(0) + [y'(0)]^2 = [y(0)]^3 \rightarrow y''(0) = -3$$

مشتق از معادله $\rightarrow y''' + 2y'y'' = e^x [y^3 + 3y'y^2]$ $a_3 = \frac{y'''(0)}{3!} = \frac{19}{6}$

$$x=0 \Rightarrow y'''(0) + 2[y'(0) \times y''(0)] = y^3(0) + 3y'(0) \times y^2(0) \rightarrow y'''(0) = 19$$

$$y = 1 + 2x - \frac{3}{2}x^2 + \frac{19}{6}x^3 + \dots$$

حل معادله ديگرينس حل نقطه متقاصم: تعيين متقاصم (عين - غير عادي) ل عادي بودن نقطه x_0 :

در معادله ديگرينس $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ اگر حد اقل یکی از توابع $p(x)$ يا $q(x)$ در نقطه $x=x_0$ تکلیلی نباشد، اين نقطه (x_0) نقطه متقاصم (عين يا غير عادي) می باشد. هرگاه $x=x_0$ يك نقطه متقاصم باشد و هر دو ضير وجود باشد (متساوی باشد) نقطه x_0 نقطه متقاصم می باشد. اما در سويله حتی یکی از دو ضير وجود نباشد (ناستاهی باشد) نقطه x_0 متقاصم نامقاصم می باشد.

مثال: معادلات ديگر انسيل

$$p_0 = \lim_{x \rightarrow x_0} [(x-x_0) p(x)] \quad q_0 = \lim_{x \rightarrow x_0} [(x-x_0)^2 q(x)]$$

به عبارت دیگر در صورتی که $y = 0$ و $p(x)y + q(x)y = 0$ به ازای $x = x_0$ حل می‌شود، x_0 را نقطه مفرد منتظم می‌نامند. در غیر این صورت x_0 را نقطه مفرد نامنتظم می‌نامند. هر دو در نقطه $x = x_0$ تحلیلی باشد، $x = x_0$ را نقطه مفرد منتظم و اگر حداقل یکی از توابع p یا q غیر تحلیلی باشند، $x = x_0$ را نقطه مفرد نامنتظم می‌نامند.

روش تعیین یافته فرونیسی برای حل معادله دیفرانسیل در نقطه مفرد منتظم:

اگر $x_0 = x_0$ نقطه مبدا منتظم معادله $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ باشد هر دو ضریب p و q به صورت $p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n (x-x_0)^n$ و $q(x) = \sum_{n=0}^{\infty} q_n (x-x_0)^n$ توسعه داده می‌شوند. در این صورت معادله حاد را می‌توان به صورت $y'' + p_0 y' + q_0 y = 0$ نوشت. این معادله را می‌توان به روش تعیین یافته فرونیسی حل کرد.

معادله محلی معادله $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ به صورت $r^2 + (p_0 - 1)r + q_0 = 0$ است.

اگر r_1 و r_2 جواب معادله محلی فوق باشند، بسته به حالات زیر می‌توان جواب معادله دیفرانسیل را مشخص نمود:

الف) اگر $r_1 \neq r_2$ باشد تفاضل آن‌ها نیز عدد صحیح نباشد:

$$y = A y_1 + B y_2 \Rightarrow \begin{cases} y_1 = (x-x_0)^{r_1} \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n \\ y_2 = (x-x_0)^{r_2} \sum_{n=0}^{\infty} b_n (x-x_0)^n \end{cases} \xrightarrow{x_0=0} \begin{cases} y_1 = x^{r_1} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \\ y_2 = x^{r_2} \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \end{cases}$$

ب) معادله محلی دارای دو ریشه تکراری $r_1 = r_2 = r$ باشد:

$$\begin{cases} y_1 = (x-x_0)^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n \\ y_2 = y_1 \ln |x-x_0| + (x-x_0)^r \sum_{n=1}^{\infty} b_n (x-x_0)^n \end{cases} \xrightarrow{x_0=0} \begin{cases} y_1 = x^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \\ y_2 = y_1 \ln x + x^r \sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n \end{cases}$$

ج) معادله محلی دارای دو ریشه متمایز $r_1 > r_2$ باشد که تفاضل آن‌ها عدد صحیح نباشد:

$$y = A y_1 + B y_2 \Rightarrow \begin{cases} y_1 = x^{r_1} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \\ y_2 = x^{r_2} \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \end{cases} \quad (r_1 \text{ که بزرگتر است})$$

$$\begin{cases} y_1 = x^{r_1} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \\ y_2 = x^{r_2} \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \end{cases} \quad (r_2 \text{ که کوچکتر است})$$

شورای علمی

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

معادلات دیفرانسیل

۱. معادله تکراننده: معادله دیفرانسیل به فرم $y = (m+1)y' + 2xy - (1-x)y$ که معادله تکراننده نامیده می شود.

ماتریس به این شکل $x=0$ یک نقطه معکولی برای معادله فوق است، بنابراین معادله دارای جوابی به صورت $y = \sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$ است که

دارای رابطه بازگشتی مقابل و شعاع همگرایی $R=1$ می باشد: $C_{n+2} = -\frac{(m-n)(m+n+1)}{(n+1)(n+2)} C_n$ $n \geq 0$

جواب عمومی معادله به صورت $y = C_1 R_m(x) + C_2 S_m(x)$ خواهد بود که بسته به زوج یا فرد بودن m ، به حالتها زیر دسته بندی می شود:

اگر $m=n$ یک عدد صحیح نامفرد باشد:

حالت ۱) اگر n زوج باشد: در این صورت یک جواب (مثلاً R_n) به صورت چند جمله ای از درجه n خواهد بود که نقاشی حل تراها y

زوج تا x می باشد و جواب دیگر به صورت یک سری توانی است.

حالت ۲) اگر n فرد باشد: در این صورت یک جواب (مثلاً S_n) به صورت چند جمله ای از درجه n خواهد بود که نقاشی حل تراها y

فرد تا x می باشد و جواب دیگر به صورت یک سری توانی است.

اگر $C_1 = C_2 = 1$ طوری انتخاب شود که تعدد چند جمله ای فوق در $n=1$ برابر ۱ شود، آن چند جمله ای تکراننده از درجه n می نامند و با $P_n(x)$

نمایش می دهند. در این حالت جواب دوم که یک سری است را با $Q_n(x)$ نمایش می دهیم.

برای میاسب $P_n(x)$ می توان از روابط زیر استفاده کرد:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (-1)^k \frac{(n-2k)!}{2^n k! (n-k)! (n-2k)!} x^{n-2k} \quad (1) \text{ استفاده از فرمول صریح}$$

(۲) تابع معکوس چند جمله ای تکراننده $P_n(x)$ ضریب t^n در بسط مک لورن $\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}}$ می باشد.

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) t^n$$

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2-1)^n] \quad (3) \text{ فرمول معکوس (رودریکس)}$$

(۴) با دانستن معادله $P_0(x)$ ، $P_1(x)$ و $P_2(x)$ و رابطه بازگشتی زیر می توان بقیه $P_n(x)$ ها را به دست آورد.

شماره ای عشق

دانشگاه ریاضی و علوم کامپیوتر

معادلات دیفرانسیل

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x, \quad P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \quad P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$$

$$P_{n+1}(x) = \frac{2n+1}{n+1} x P_n(x) - \frac{n}{n+1} P_{n-1}(x) \quad \text{و} \quad P_n'(x) = \frac{1}{n} [(2n-1)x P_{n-1}'(x) - (n-1) P_{n-2}'(x)]$$

خواص مهم تابع لژاندر :

$$\text{I) } P_n(1) = 1, \quad P_n(-1) = (-1)^n \quad \text{II) } P_n(-x) = (-1)^n P_n(x) \quad \xrightarrow{\text{یعنی}} \begin{cases} n: \text{ فرد} \rightarrow P_n(x) \text{ فرد} \\ n: \text{ زوج} \rightarrow P_n(x) \text{ زوج} \end{cases}$$

$$\text{III) } P_{2n+1}(0) = 0, \quad P_n(0) = (-1)^n \frac{(2n)!}{2^n (n!)^2}$$

$$m \neq n \Rightarrow \int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = 0 \quad \text{IV) مجموعه چند جمله ای } P_n(x) \text{ از یکدیگر متعامدند}$$

$$P_m(x) = 1 \quad \text{نکته:} \quad \int_{-1}^1 P_n(x) dx = \int_{-1}^1 P_0(x) P_n(x) dx = 0 \quad n \neq 0$$

$$m = n \Rightarrow \int_{-1}^1 |P_n(x)|^2 dx = \frac{2}{2n+1}$$

$$\int_{-1}^1 P_n(x) dx = 0 \quad \text{برای } n \neq 0$$

$$\text{V) } P_n'(x) = \frac{1}{n} [(2n-1)x P_{n-1}'(x) - (n-1) P_{n-2}'(x)] \quad \text{VI) چند رابطه بازگشتی برای تابع لژاندر}$$

$$\text{1) } P_{n+1}'(x) - P_{n-1}'(x) = (2n+1) P_n(x) \quad \text{2) } (x^2-1) P_n'(x) = n x P_n(x) - n P_{n-1}'(x)$$

مثال: فرض کنید اگر تابع $f(x)$ در بازه $[-1, 1]$ پیوسته باشد و در نقاط ناپیوستگی، مشتق چپ و راست آن موجود باشد.

$$\text{تابع } f \text{ را در این بازه به عنوان یک مجموع تابع لژاندر به صورت } f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n P_n(x) \text{ نوشت که می توان نوشت}$$

$$c_n = \frac{2}{2n+1} \int_{-1}^1 f(x) P_n(x) dx \quad \text{نکته: در هر نقطه ناپیوستگی، سری به مقدار } \frac{1}{2} [f(x^+) + f(x^-)] \text{ همگرا می شود}$$

مثال: معادله بسل: هر معادله به فرم $x^2 y'' + x y' + (x^2 - k^2) y = 0$ که در آن k یک عدد دلخواه است (معادله

بسل می نامند). چنان $x=0$ یک نقطه تفرد منتظم است، لذا معادله متخفیه آن به صورت $x^2 y'' + (1-k^2) y = 0$ یعنی

$$y = \sum c_n x^{n+r} \quad r_1 = +k \quad r_2 = -k \quad \text{نمایان: } r^2 - k^2 = 0$$

$$J_{\nu}(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! \Gamma(\nu+m+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{\nu+m}$$

جواب متناظر با $\nu = 1/2$ برای تابع بسل نوع اول می باشد. $J_{\nu}(x)$ تابعی می باشد.

تابع $J_{\nu}(x)$ دارای شعاع همگرایی ∞ است. آن را تابع بسل نوع اول از مرتبه ν می نامند.

$$J_{\nu}(x) = \int_0^x t^{\nu-1} e^{-t} dt \quad \text{این تابع برای } \nu > 0 \text{ بصورت زیر تعریف می شود}$$

خاصیت تابع گاما:

$$\Gamma(x+1) = x \Gamma(x) \quad \text{رابطه بازگشتی}$$

۱) $\Gamma(1) = 1$, $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$, اگر ν عدد صحیح باشد $\Gamma(n) = (n-1)!$, ۲) $\Gamma(n+1) = n!$

۳) خاصیت تابع بسل نوع اول:

$$J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x) \quad \text{برای } n \in \mathbb{N}$$

۱) $J_{\nu}(x)$ برای ν گانجر، تابعی زوج (شکل تراکواز درجست) یا $J_{\nu}(x)$ برای ν کافرد، تابعی فرد (شکل تراکافرد) است.

۳) مهم:

$$\frac{d}{dx} (x^{\nu} J_{\nu}(x)) = x^{\nu} J_{\nu-1}(x) \rightarrow \int x^{\nu} J_{\nu}(x) dx = x^{\nu} J_{\nu}(x)$$

۴) مهم:

$$\frac{d}{dx} (x^{-\nu} J_{\nu}(x)) = -x^{-\nu} J_{\nu+1}(x) \rightarrow \int x^{-\nu} J_{\nu}(x) dx = -x^{-\nu} J_{\nu}(x)$$

$$\int J_1(x) dx = -J_0(x)$$

کاهش مرتبه تابع بسل اول:

$$J_{\nu+1}(x) = \frac{2\nu}{x} J_{\nu}(x) - J_{\nu-1}(x)$$

افزایش مرتبه تابع بسل اول:

$$J_{\nu-1}(x) = \frac{2\nu}{x} J_{\nu}(x) - J_{\nu+1}(x)$$

۵) تابع بسل نوع دوم:

جواب معادله متناظر با $\nu = +1/2$ برای تابع بسل نوع اول می باشد. پس جواب دوم به متناظر با $\nu = -1/2$ است. بنابراین $\nu = -1/2$ در معادله

بسل نوع اول به دست می آید:

$$J_{-\nu}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(-\nu+k+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{-\nu+k}$$

اگر ν ... را دارد $\nu \neq 0$ باشد، جواب عمومی معادله بسل عبارت است از:

$$y = C_1 J_{\nu}(x) + C_2 J_{-\nu}(x)$$

ولی در صورتی که $\nu = 0$ باشد، جواب دوم لاگاریتمی است و آن را به صورت

$$y = \alpha J_0(x) \ln x + x^{-\nu} \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

شعاع همگرایی

معادلات دیفرانسیل

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

فی نوینم متحد - اسماء علیہ السلام علی بن ابی طالب و آلہ و سلم بیرون بخاری فی حدیث

$$y_n(n) = a(y_r + b j_n(n)) \quad , \quad a = \frac{r}{R} \quad , \quad b = K - L_n r$$

در تعدادی صورت $75772 = 8$ کتاب اولیه اینند $\frac{7}{10}$ کتاب سبکی نوع دوم (یا جامع نیویلی) مرتبه ۲ نامند.

$$\begin{cases} Y_{\nu^2}(n) = \frac{1}{\sin(\pi \nu^2)} \left(J_{\nu^2}(n) \cos(\nu^2 \pi) - J_{-\nu^2}(n) \right) & (\nu^2 \neq 0, 1, 2, \dots) \\ Y_n(n) = \lim_{\nu^2 \rightarrow n} Y_{\nu^2}(n) & (n = 0, 1, 2, \dots) \end{cases}$$

فهم طوی تابع بی نفع ندانم:

که در این صورت جواب عمومی به شکل زیر به صورت $y = C_1 J_{\frac{n}{2}} + C_2 Y_{\frac{n}{2}}$ خواهد بود.

مطابق با شده برای جامع سطح = بدن و تغذیه برای جامع سطح نوع دوم نیز مرتب است.

معارفہ حاصل تہ عمل بہ معارفہ عمل :
برخی معارفہ لری ترا با تفسیر متغیر مناسب بہ معارفہ عمل تہ عمل بخود

مثال (I) معادله $x'' + \alpha x' + (\lambda^2 x^2 - \mu^2) y = 0$ را با معادله سل الزمیت $z = \lambda x$ به دست آوریم

$$y = c_1 J_{\mu}(x) + c_2 J_{-\mu}(x)$$

ن دمنبر مستقر Z تبدیل می شود:

مثال (II) : $x^2 y'' + x y' + F(x^2 - k^2) y = 0$ با تغییر متغیر $z = x^2$ به معادله سل از مرتبه 2 با ضرایب متغیر

$$y = c_i J_k(x^r) + c_r J_{-k}(x^r)$$

ح تبدیل می شود:

مسألة (III) معادلة $z = \sqrt{x}$ بالمتغير x $Kx'' + Kxy' + (x - K^2)y$ بالمتغير x $Kx'' + Kxy' + (x - K^2)y$

$$y = C_1 J_{\frac{k}{2}}(\sqrt{x}) + C_2 J_{-\frac{k}{2}}(\sqrt{x})$$

۱۰۰

۱۰۰۔ تبدیل لایلاس رک بر دو آن در حل معادلات دیفرانسیل حل:

فیل لاپلاس تابع $F(s)$ برای $t \geq 0$ به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$F(s) = L[f(t)] = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt, \quad s > 0$$

مقدار Δt را به قدری کوچک می‌گیریم که در آن بازه، $f(t)$ تقریباً ثابت باشد. در این صورت می‌توانیم $f(t)$ را از زیر علامت انتگرال خارج کنیم و داریم:

اگر $f(t) = L[f(s)]$ باشد، آن گاه $F(t) = L[F(s)]$ لایپلاس معکوس $f(s)$ می نامیم.

تبدیل لایپلاس و معکوس آن دارای خاصیت خطی هستند:

$$L[c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t)] = c_1 L[f_1(t)] + c_2 L[f_2(t)]$$

تبدیل لایپلاس برای توابع مهم:

| $f(t)$ | K | $K t^n$ | $K t^\alpha$ | $K e^{at}$ | $K \sin at$ | $K \cos at$ |
|--------|-----------------|--|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| $F(s)$ | $K \frac{1}{s}$ | $K \frac{n!}{s^{n+1}}$ $n \in \mathbb{N}$ | $K \frac{\Gamma(\alpha+1)}{s^{\alpha+1}}$ $\alpha > -1$ | $K \frac{1}{s-a}$ | $K \frac{a}{s^2+a^2}$ | $K \frac{s}{s^2+a^2}$ |

| $f(t)$ | $K \sin hat$ | $K \cosh at$ | $K e^{iax}$ | سبل مرتبه ضربه $J_0(t)$ | $J_1(t)$ |
|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| $F(s)$ | $K \frac{a}{s^2+a^2}$ | $K \frac{s}{s^2-a^2}$ | $K \frac{s+ia}{s^2+a^2}$ | $\frac{1}{\sqrt{s^2+1}}$ | $1 - \frac{s}{\sqrt{1-s^2}}$ |

$$L^{-1}\left(\frac{1}{s^n}\right) = \frac{t^{n-1}}{(n-1)!}$$

• قضیه انتقال "خود": اگر $F(s)$ تبدیل لایپلاس تابع $f(t)$ باشد،

$$e^{at} f(t) \leftrightarrow F(s-a)$$

• تبدیل لایپلاس مشتق: اگر $f(t)$ برای $t \geq 0$ از مرتبه n امی $\left[\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(t)}{e^{at}} = 0\right]$ به صورت قطعی پیوسته باشد، $F(s)$ تبدیل لایپلاس $f(t)$ باشد، آن گاه:

$$L[f'(t)] = s F(s) - f(0) \quad L[f''(t)] = s^2 F(s) - s f(0) - f'(0) \quad \dots$$

$$L[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - \dots - s f^{(n-1)}(0) - f^{(n-1)}(0)$$

• مشتق از تبدیل لایپلاس: اگر $F(s)$ تبدیل لایپلاس تابع $f(t)$ باشد، داریم صورت خواهیم داشت:

$$L[t f(t)] = -F'(s) \quad L[t^2 f(t)] = +F''(s) \quad \dots \quad L[t^n f(t)] = (-1)^n F^{(n)}(s)$$

تذکره: با توجه به رابطه فوق، اگر مشتق تبدیل لایپلاس تابع $(F'(s))$ داشته باشیم، لایپلاس معکوس آن نیز بدست می آید، تابع $f(t)$ می نامیم.

شماره ای عشق

دانشگاه ریاضی و علوم کامپیوتر

معادلات دیفرانسیل